Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

**Интенсивная терапия и анестезиологическое обеспечение
в перипартальном периоде у беременных
с сопутствующими заболеваниями
сердечно-сосудистой системы**

Баутин А.Е.

Потребление кислорода (VO_2)

Показатель	VO_2 мл/кг/мин	VO_2 мл/м ² /мин
VO_2 в покое (один метаболический эквивалент)	3 мл/кг/мин	125 мл/м ² /мин
Два метаболических эквивалента	6 мл/кг/мин	250 мл/м ² /мин
Четыре метаболических эквивалента	12 мл/кг/мин	500 мл/м ² /мин
VO_2 максимальное	45 мл/кг/мин	1800 мл/м ² /мин

Показатели, актуальные для анестезиолога

- VO_2 в покое
- Два метаболических эквивалента

Потребление кислорода во время беременности

Период	VO ₂ в покое мл/кг/мин
До беременности	3 мл/кг/мин
20 неделя беременности	4 мл/кг/мин
32 неделя беременности	4,1 мл/кг/мин
12 неделя после родов	3,7 мл/кг/мин

Увеличение потребления кислорода на 30%
4 мл/кг/мин (ок. 160 мл/мин/м²)

Pivarnik J., Stein A., Rivera J. Effect of pregnancy on heart rate/oxygen consumption calibration curves. Med. Sci. Sports Exerc. – 2002. – 34: 750–755.

Увеличение доставки кислорода

Минутный объем
кровообращения

Содержание
кислорода

Ударный
объем

ЧСС

Преднагрузка

Постнагрузка

Сократимость

Объем
циркулирующей
крови

Сосудистое
сопротивление

Изменения гемодинамики во время беременности

Система организма	%
Сердечно-сосудистая система	
Периферическая сопротивляемость сосудов	-15
ЧСС	+15
Ударный объем	+30
Объем крови	+35
Сердечный выброс	+40
Объем плазмы	+45

Объем циркулирующей крови

Размеры камер сердца

Размеры камер сердца (измеренные эхокардиографически)
во время беременности и после родов ($n = 18$)

Камера, мм	Недели беременности				Роды	Контроль
	8-12	20-24	30-34	36-40		
ЛЖ	41,1±3,1	42,7±2,2	43,0±1,7	43,6±2,5	41,8±1,8	40,1±3,0
ЛП	29,6±2,1	31,5±2,4	33,1±2,4	32,8±3,0	29,9±3,1	28,9±2,4
ПЖ	30,1±2,0	31,9±2,1	35,5±3,2	35,5±2,3	31,1±2,1	28,5±3,0
ПП	42,8±2,3	47,4±2,4	50,8±2,7	50,9±2,8	46,6±3,3	43,7±4,4

Периферическое сосудистое сопротивление

Сердечный выброс

Сердечный выброс = ударный объем x ЧСС

Гемодинамика во время родов

Роды

- ↑ потребление O_2 ;
- ↑ сердечный выброс;
- увеличение сердечного выброса зависит от условий родов (эпидуральная анальгезия, кесарево сечение)

Послеродовый период

- прирост ОЦК из плаценты и сократившейся матки;
- выраженное увеличение преднагрузки

Значение физиологических гемодинамических сдвигов для беременных с заболеваниями сердца

Увеличение объема циркулирующей крови

Увеличение преднагрузки

Увеличение давления наполнения камер сердца

Застойные явления в большом или малом круге

Значение физиологических гемодинамических сдвигов для беременных с заболеваниями сердца

Увеличение объема циркулирующей крови

Увеличение преднагрузки

Растяжение камер сердца

Увеличение степени недостаточности поврежденных клапанов

Значение физиологических гемодинамических сдвигов для беременных с заболеваниями сердца

Увеличение объема циркулирующей крови

```
graph TD; A[Увеличение объема циркулирующей крови] --> B[Увеличение преднагрузки]; B --> C[Увеличение потребления кислорода  
снижение доставки кислорода]; C --> D[Ишемия миокарда];
```

Увеличение преднагрузки

Увеличение потребления кислорода
снижение доставки кислорода

Ишемия миокарда

Значение физиологических гемодинамических сдвигов для беременных с заболеваниями сердца

Увеличение объема циркулирующей крови

Увеличение преднагрузки

Растяжение камер сердца

Снижение выраженности обструкции при гипертрофической кардиомиопатии

АКТУАЛЬНОСТЬ

Причины материнской смертности (США, 2013)

АКТУАЛЬНОСТЬ

Заболевания сердечно-сосудистой системы у беременных

Врожденная патология сердца

- корригированная;
- некорригированная

Патология клапанного аппарата

- некорригированная
- корригированная

Кардиомиопатии

- предсуществующие
- перипартальная

Ишемическая болезнь сердца

Артериальная гипертензия

Аритмии

Венозные тромбозы

Легочная гипертензия

Аортальный стеноз

Митральный стеноз

Митральная недостаточность

Механические протезы клапанов

Острая сердечная недостаточность

Легочная артериальная гипертензия

2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy

The Task Force for the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC)

Endorsed by: the International Society of Gender Medicine (IGM), the German Institute of Gender in Medicine (DGesGM), the European Society of Anaesthesiology (ESA), and the European Society of Gynecology (ESG)

Regitz-Zagrosek V., et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 39(34):3165-3241.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 2018. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработаны Комитетом экспертов Российского кардиологического общества (РКО). Секция заболевания сердечно-сосудистой системы у беременных

Авторы/члены Комитета экспертов по разработке Национальных рекомендаций: профессор Стрюк Р.И. (Москва) (Председатель)*, профессор Бунин Ю.А. (Москва), д.м.н. Гурьева В. М. (Москва), к.м.н. Иртюга О.Б.* (Санкт-Петербург), член-корр. РАН, профессор Коков Л. С. (Москва), к.м.н. Коломацкая О. Е. (Ростов-на-Дону), д.м.н. Моисеева О. М. (Санкт-Петербург), профессор Мравян С. Р. (Москва), профессор Чесникова А. И. (Ростов-на-Дону), д.м.н. Чулков В. С. (Челябинск).

Состояния с высоким риском, беременность противопоказана

- Легочная артериальная гипертензия любой природы
- Тяжелая дисфункция левого желудочка (ФВ < 30%, NYHA III-IV)
- Предшествующая перипартальная кардиомиопатия с любым остаточным нарушением функции левого желудочка
- Тяжелый митральный стеноз, тяжелый симптомный аортальный стеноз
- Расширение аорты > 45 мм при синдроме Марфана
- Расширение аорты > 50 мм при двухстворчатом аортальном клапане
- Тяжелая коарктация аорты

Regitz-Zagrosek V., et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 39(34):3165-3241.

Состояния, при которых показано оперативное абдоминальное родоразрешение

- Тяжелый аортальный стеноз
- Синдром Эйзенменгера
- Диссекция аорты
- Аневризмы восходящей аорты с расширением > 45 мм
- Преждевременные роды у пациенток, получающих непрямые антикоагулянты

Regitz-Zagrosek V., et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 39(34):3165-3241.

Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"»

IV. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи

Приобретенные пороки сердца, требующие направления беременной в специализированный стационар

Ревматические пороки сердца при наличии:

- активного ревматического процесса;
- недостаточности кровообращения;
- стенозов и недостаточности клапанов II и более степени;
- легочной гипертензии;
- бактериального эндокардита;
- нарушений сердечного ритма;
- тромбозомболических осложнений;
- атриомегалии или кардиомегалии;
- перенесенных кардиохирургических вмешательств

10 – 12 недель

Определение показаний
для прерывания
беременности

Прерывание
беременности

18 – 22 недели

27 – 32 недели

35 – 37 недель

Состояния, при которых у женщин с приобретенными пороками сердца имеются медицинские показания для прерывания беременности

- активный ревматический процесс;
- недостаточность кровообращения IIБ – III ст;
- легочная гипертензия;
- бактериальный эндокардит;
- нарушения сердечного ритма (фибрилляция предсердий, пароксизмальные тахикардии, полная AV блокада);
- тромбоэмболические осложнения;
- атриомегалия или кардиомегалия;

*Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 5 декабря 2007 г.
№ 736*

10 – 12 недель

Определение показаний для прерывания беременности

Прерывание беременности

18 – 22 недели

Оценка возможности донашивания беременности

Родоразрешение

Операция на сердце

27 – 32 недели

Оценка возможности донашивания беременности

Родоразрешение

Операция на сердце

35 – 37 недель

Родоразрешение

Состояния, при которых показано оперативное абдоминальное родоразрешение

- Тяжелый аортальный стеноз
- Синдром Эйзенменгера
- Диссекция аорты
- Аневризмы восходящей аорты с расширением > 45 мм
- Преждевременные роды у пациенток, получающих непрямые антикоагулянты

Regitz-Zagrosek V., et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. Eur Heart J. 2018; 39(34):3165-3241.

Общие положения

Участие кардиоанестезиолога на всех этапах
периоперационного периода

Выбор метода анестезии

Вид порока	Общая анестезия	Эпидуральная анестезия
Тяжелый аортальный стеноз	+	- (!!!)
Тяжелый митральный стеноз	+	- (!!!)
Тяжелая митральная недостаточность	+	+/-

Эпидуральная анестезия у беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Клинические ситуации, при которых может быть использована как эпидуральная, так и общая анестезия

Эпидуральная анестезия противопоказана

Должна использоваться эпидуральная анестезия, поскольку риски при общей значительно выше

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Баутин А. Е.¹, Бельских Ю. Н.², Москаленко В. В.²,
Фредерикс Е. В.², Якубов А. В.¹, Пожидаева А. М.¹,
Арам-Балык Н. В.¹, Радвская В. А.², Меркулова Л. Г.¹,
Абуталимова Н. Р.¹, Мазурок В. А.¹

Контактная информация:
Баутин Андрей Евгеньевич,
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
ул. Авиаторов, д. 2, Санкт-Петербург,
Россия, 197341.
E-mail: abautin@mail.ru

Баутин А.Е., Бельских Ю.Н., Москаленко В.В., Фредерикс Е.В., Якубов А.В., Пожидаева А.М., Арам-Балык Н.В., Радвская В.А., Меркулова Л.Г., Абуталимова Н. Р., Мазурок В. А. Регионарная анестезия у беременных с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы// Трансляционная медицина. - 2019. - Т. 6. № 6. - С. 29-39

Общие положения

Интраоперационный мониторинг

- Стандартный
- Центральный венозный катетер
до индукции анестезии
- Катетер в лучевой артерии
до индукции анестезии
- Катетер в легочной артерии
до индукции анестезии
- Система мониторинга PICCO
- Возможность выполнения ЭхоКГ

Сопутствующие повреждения клапанного аппарата сердца

Клапаны сердца

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Возраст начала клинических проявлений аортального стеноза различной этиологии

- **Врожденный АС** **0-30**
- **Двустворчатый АК** **30-50**
- **Ревматический АС** **30-60**
- **Атеросклеротический (дегенеративный) АС** **>60 (70-85)**

Двустворчатый аортальный клапан

- Несмотря на то, что только 0.5-2% общей популяции рождаются с бicuspidальным АК, 43% пациентов, прооперированных или умерших вследствие болезни АК, имеют эту аномалию.

Двустворчатый аортальный клапан

В большинстве случаев развиваются дегенеративные изменения (воспаление, фиброз, ангионеогенез, оссификация)

Бикуспидальный аортальный клапан

Петля «объем-давление» для левого желудочка

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Аортальный
стеноз

Увеличение
постнагрузки

Гипертрофия
миокарда

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

1. **Стадия компенсации.** Сердечный выброс не снижен.
Высокое конечно-диастолическое давление ЛЖ

2. **Стадия декомпенсации.** Сердечный выброс снижен.
Высокое конечно-диастолическое давление ЛЖ

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Эхокардиографическая оценка тяжести аортального стеноза

Максимальная скорость на клапане

Градиент давления

Площадь отверстия аортального клапана

- $\Delta P \text{ max} = 4v^2$
- $\Delta P \text{ mean} = 2.4V\text{max}^2$

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

В норме площадь аортального клапана 2 см²,
максимальная скорость менее 2 м/с

Степень АС	V max, м/с	Максимальный градиент мм рт. ст.	Средний градиент мм рт. ст.	Площадь АК см ²
Легкий АС	<3	<36	<25	>1,5
Умеренный АС	3-4	36-64	25-40	1-1,5
Тяжелый АС	>4	>64	>40	<1

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Симптомы АС

- **Стенокардия**
- **Обмороки**
- **Одышка**

АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Беременность противопоказана при тяжелом симптомном аортальном стенозе.

При тяжелом аортальном стенозе показано абдоминальное родоразрешение.

Интенсивная терапия в дородовом и послеродовом периодах.

Анестезиологическое обеспечение абдоминального родоразрешения.

Интенсивная терапия в дородовом периоде. Клинический вариант I. Венозная легочная гипертензия.

1. Удерживать синусовый ритм

-антиаритмическая терапия

2. Оксигенотерапия

3. Нитропрепараты

нитроглицерин, изосорбида динитрат

инфузия: 0,3-1 мкг/кг/мин;

болюсно: изосорбида динитрат 5 мг: 20,0, по 1,0 (250 мкг);

-цель терапии: снижение ДЛАсис менее 40 мм рт.ст.

(ЭхоКГ). АД сис не менее 100 мм рт.ст.

4. Диуретики

-фуросемид болюсно, инфузия: 2-10 мг/час

5. Поддержание коллоидно-осмотического давления.

- альбумин плазмы не менее 25 г/л

Интенсивная терапия в дородовом периоде. Клинический вариант II. Снижение сердечного выброса.

1. Удерживать синусовый ритм

- антиаритмическая терапия

2. Инотропная терапия

- показана в случаях выраженной гипоперфузии (лактат-ацидоз, олигурия);
- показана в случаях артериальной гипотензии АДср. менее 65 мм рт.ст.;
- дофамин от 2,5 мкг/кг/мин. Следить за нарушениями ритма!

4. Вазопрессоры

- в случаях рефрактерной артериальной гипотонии назначаются вазопрессоры;
- норадреналин от 0,03 мкг/кг/мин

Анестезиологическое обеспечение абдоминального родоразрешения пациенток с аортальным стенозом

Кесарево сечение пациенткам с тяжелым симптомным (особенно при снижении сердечного выброса) аортальным стенозом должно выполняться в условиях кардиохирургической операционной при собранном аппарате ИК

Общая комбинированная анестезия на основе галогенсодержащих анестетиков

Анестезиологическое обеспечение абдоминального родоразрешения пациенток с аортальным стенозом

Должны быть приготовлены для болюсного введения:

- адреналин 2,5 мкг/мл;
- норадреналин 5 мкг/мл;
- изосорбида динитрат 250 мкг/мл;
- лидокаин 2 мг/кг

Должны быть приготовлены для инфузии

- дофамин;
- норадреналин;
- изосорбида динитрат

Должны быть в наличии

- β -адреноблокаторы для в/в введения;
- амиодарон

Анестезиологическое обеспечение абдоминального родоразрешения пациенток с аортальным стенозом

Центральный венозный катетер

-до индукции анестезии;

Катетер в лучевой артерии

-до индукции анестезии;

Возможность выполнения трансторакальной ЭхоКГ

Анестезиологическое обеспечение абдоминального родоразрешения пациенток с аортальным стенозом

Преднагрузка	В зависимости от клинической ситуации
Постнагрузка	↑ (при развитии артериальной гипотонии)
Контрактильность	↑ (при развитии артериальной гипотонии)
Ритм	Синусовый, профилактика вентрикулярных нарушений

Анестезиологическое обеспечение абдоминального родоразрешения пациенток с аортальным стенозом

Медленная индукция.

- пропофол (разрешенные формы);
- кетамин

После извлечения ребенка

- выраженное увеличение преднагрузки, связанное с сокращением матки;
- болюсное введение изосорбида динитрата

Карбетоцин 100 мкг

Окситоцин

- обладает вазодилатирующим эффектом;
- микроструйное введение в дозе 2,5 МЕ в час

← Давление в легочной
артерии

← ЧСС

← Артериальное
давление

Митральный стеноз

Этиология
ревматизм

Митральный стеноз

Стеноз митрального клапана

Увеличение давления в левом предсердии

Легочная венозная гипертензия

Митральный стеноз

Фиксированный ударный объем

Снижение сердечного выброса

Митральный стеноз

Гемодинамический профиль

- Сердечный выброс снижен
- Периферическое сопротивление сосудов большого круга повышено.
- Артериальное давление нормальное или сниженное
- Повышенное давление в малом круге кровообращения

Митральный стеноз

European Heart Journal
doi: 10.1093/eurheartj/ehz218

ESC GUIDELINES

ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy

Пациенткам, имеющим стеноз митрального клапана, показано родоразрешение через естественные родовые пути в условиях эпидурального обезболивания

При тяжелом симптомном митральном стенозе выполняется чрескожная митральная комиссуротомия

Митральный стеноз

Тактика при симптомном течении у беременных

Преднагрузка	↓ С осторожностью, т.к. от давления в левом предсердии зависит наполнение левого желудочка
Постнагрузка	↑ (при развитии артериальной гипотонии)
Контрактильность	Увеличение не эффективно
Ритм	По возможности удерживать синусовый. Избегать тахикардии

- Общая комбинированная анестезия;
- медленная индукция;
- предупреждение гиперволемии после извлечения ребенка

Митральная недостаточность

регургитация
(кровь возвращается
в предсердие)

**створки митрального
клапана смыкаются
не плотно**

Митральная недостаточность

Первичная митральная недостаточность

- ревматизм;
- бактериальный эндокардит;
- дегенеративная митральная недостаточность;
- врожденная;
- травма

Вторичная митральная недостаточность

- повреждение папиллярных мышц при инфаркте миокарда;
- относительная митральная недостаточность при дилатации левого желудочка

Митральная недостаточность

Митральная недостаточность

Гемодинамический профиль

- Конtrakтильность не нарушена, но снижен эффективный сердечный выброс.
- Периферическое сопротивление сосудов большого круга не повышено.
- Артериальное давление нормальное.
- Повышенное давление в малом круге кровообращения.

Митральная недостаточность

European Heart Journal
doi: 10.1093/eurheartj/ehz218

ESC GUIDELINES

ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy

Пациенткам с недостаточностью митрального клапана показано родоразрешение через естественные родовые пути в условиях эпидурального обезболивания

Митральная недостаточность

Тактика при симптомном течении у беременных

Преднагрузка	↓↓ Агрессивное снижение под контролем ДЗЛК (менее 15 мм рт.ст) или ЭхоКГ (ДЛАСис менее 40 мм рт.ст)
Постнагрузка	↓ для уменьшения регургитации
Контрактильность	↑ (при необходимости)
Ритм	Без специфических указаний
Особые условия	Альбумин плазмы не менее 25 г/л

А.Е. Баутин, 2021

А.Е. Баутин, 2021

А.Е. Баутин, 2021

Пациентки с механическими протезами клапанов сердца

А.Е. Баутин, 2021

А.Е. Баутин, 2021

А.Е. Баутин, 2021

Пациентки с протезами клапанов сердца

European Heart Journal
doi: 10.1093/eurheartj/ehz218

ESC GUIDELINES

ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy

Пациенткам с протезами клапанов сердца показано родоразрешение через естественные родовые пути в условиях эпидурального обезболивания

Пациентки с протезами клапанов сердца

Рекомендации	Класс	Уровень
• Оральные антикоагулянты во II и III триместрах до 34-36 недели	I	C
• Возможен прием ОАК в I триместре при дозе варфарина не более 5 мг, при подписании ИС (2aC)	IIa	C
• Если доза варфарина более 5 мг в сутки, в I триместре используют НМГ или НФГ		
• При развитии родовой деятельности на терапии ОАК показано оперативное родоразрешение	I	C
• Замена ОАК на НМГ или НФГ на 34-36 неделе	I	C
• НМГ должны быть заменены на внутривенные НФГ за 36 часов до планируемых родов и возобновлены через 4-6 часов после родов, при условии отсутствия кровотечения	I	C
• НМГ не используются, если нет возможности контроля анти-Ха	I	C

Экстренные оперативные вмешательства у пациенток, получающих варфарин

- Снижение МНО менее 1,5
- Свежезамороженная плазма 10,0-15,0 мл/кг
- Концентраты факторов протромбинового комплекса (II, VII, IX и X). Октаплекс[®], Протромплекс 600[®]. Расчет дозы по формуле: необходимая доза (МЕ) = масса тела (кг) × желаемое повышение протромбина по Квику (%).

ИЛИ: при МНО от 2 до 3,9 — 25 МЕ/кг; при МНО

от 4 до 5,9 — 35 МЕ/кг; при МНО более 6 — 50 МЕ/кг

П-ка К., 32 лет, 50 кг, беременность 33 1/7 нед.
 Соп.: протезирование МК (механический протез).
 Терапия варфарином в дозе 5 мг/сут МНО — 2,55
 Экстренное кесарево сечение в связи с ухудшением
 состояния плода

Протромплекс 1200 МЕ

ТЕГ

15 минут

МНО

30 минут

1,6

Опыт специализированного перинатального центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (01.2011 – 03.2020)

- Родоразрешены 48 пациенток с протезами клапанов сердца
- 9 самостоятельных родов
- 39 оперативных родоразрешений
- 8 случаев тромбозов клапанов на фоне беременности

Острая сердечная недостаточность у беременных

European Heart Journal (2012) 33, 1787–1847
doi:10.1093/eurheartj/ehs104

ESC GUIDELINES

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012

Острая сердечная недостаточность — быстроразвивающийся симптомокомплекс, вызванный нарушениями функций сердца. Эти нарушения могут быть связаны с систолическими и диастолическими расстройствами, аритмиями, чрезмерными пред- и постнагрузкой. Острая сердечная недостаточность может быть как первым проявлением серьезной патологии сердца так и результатом декомпенсации хронической сердечной недостаточности.

Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Society of Cardiology; 2012.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Частота встречаемости острой сердечной недостаточности в акушерских стационарах

Учреждение	Значение
Родильные дома Санкт-Петербурга	0,5 – 1,5 на 1000 родов
Специализированный перинатальный центр НМИЦ им. В.А. Алмазова	7,5 на 1000 родов

Острая сердечная недостаточность у беременных

Впервые возникшая

Декомпенсация
предсуществующего
заболевания

Причины развития острой сердечной недостаточности в перипартальном периоде

Впервые возникшая острая сердечная недостаточность

- Повреждение миокарда II типа при массивной кровопотере, вызванное гипотонией, анемией, перегрузкой объемом
- Повреждение миокарда II типа при анафилактическом шоке
- Повреждение миокарда II типа при эмболии околоплодными водами
- Повреждение миокарда II типа при гипоксии
- Стресс-индуцированная кардиомиопатия (синдром Такоцубо)
- Перипартальная кардиомиопатия.
- Острая правожелудочковая недостаточность при ТЭЛА

Причины развития острой сердечной недостаточности в перипартальном периоде

Декомпенсация предсуществующего заболевания

- Декомпенсация хронической сердечной недостаточности при дилатационной кардиомиопатии
- Декомпенсация хронической сердечной недостаточности при патологии клапанного аппарата
- Декомпенсация хронической сердечной недостаточности при врожденных пороках сердца

Классификация острой сердечной недостаточности

Систолическая недостаточность левого желудочка

“Backward”

**Венозная легочная
гипертензия**

**Застой в малом круге,
кардиогенный отек
легких**

“Forward”

**Снижение сердечного
выброса**

**Синдром малого
сердечного выброса,
кардиогенный шок**

Систолическая дисфункция левого желудочка

↑ конечно-диастолическое
давление в левом
желудочке

↑ давление в левом
предсердии

↑ давление в
легочной артерии

Клиническая классификация острой сердечной недостаточности European Society of Cardiology, 2012

European Heart Journal (2012) 33, 1787–1847
doi:10.1093/eurheartj/ehs104

ESC GUIDELINES

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012

1	Острая декомпенсация ХСН
2	ОСН при гипертоническом кризе
3	Кардиогенный отек легких
4	Синдром малого сердечного выброса
5	ОСН при остром коронарном синдроме
6	Правожелудочковая ОСН

Структура клинических форм острой сердечной недостаточности у пациентов отделения кардиотерапевтической реанимации НМИЦ им. В.А. Алмазова

Структура клинических форм острой сердечной недостаточности у пациентов отделения реанимации для взрослых пациентов Специализированного перинатального центра

Острая сердечная недостаточность синдром малого сердечного выброса при недостаточности левого желудочка

1	Острая декомпенсация ХСН
2	Отек легких при гипертоническом кризе
3	Кардиогенный отек легких
4	Синдром малого сердечного выброса
5	ОСН при остром коронарном синдроме
6	Правожелудочковая сердечная недостаточность

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Кардиогенный шок — это сочетание артериальной гипотонии (АДсис. менее 90 мм рт. ст.) при нормальной волевической нагрузке сердца с признаками гипоперфузии органов и тканей.

Синдром низкого сердечного выброса при недостаточности левого желудочка

Систолическая
Левожелудочковая
недостаточность

Снижение
производительности
сердца

Гипоперфузия
тканей и органов

Доставка кислорода
сердечный выброс
×
содержание кислорода
в артериальной крови

Основной патофизиологический механизм синдрома малого выброса — критическое снижение производительности сердца, связанные с этим падение доставки кислорода к тканям и тяжелая гипоперфузия органов

Синдром низкого сердечного выброса

Инструментальная диагностика

Определение минутного объема кровообращения

Показатель	Значение, соответствующее синдрому малого выброса
Сердечный индекс	2,0 л/мин/м ²
Индекс ударного объема	36 мл/м ²

Инвазивные методики:

Метод Фика

Пулмональная термодиллюция (Swan-Ganz)

Транспулмональная термодиллюция (PiCCO)

Неинвазивные методики:

Эхокардиография

Синдром низкого сердечного выброса

Инструментальная диагностика

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200
doi:10.1093/eurheartj/ehw128

ESC GUIDELINES

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Рекомендация	Класс	Уровень
У всех пациентов с подозрением на кардиогенный шок рекомендуется незамедлительное выполнение ЭКГ и ЭхоКГ	I	C
Рекомендуется непрерывный мониторинг ЭКГ, АД, SpO ₂	I	C
Рекомендуется непрерывный инвазивный мониторинг АД с установкой артериальной линии	I	C
Катетеризация легочной артерии может быть рассмотрена в случаях ОСН, рефрактерной к фармакологической терапии	IIb	C

Синдром низкого сердечного выброса

Лабораторная диагностика

Показатели, основанные на интерпретации принципа Фика

Показатель	Значение, соответствующее синдрому малого выброса
PvO_2	< 33 мм рт.ст.
SvO_2	< 65%
$PvCO_2 - PaCO_2$	> 10 мм рт.ст.

Показатели, свидетельствующие о снижении перфузии органов и тканей

Показатель	Значение, соответствующее синдрому малого выброса
Лактат	> 2 ммоль/л
Креатинин, мочевины	Увеличение при динамическом наблюдении
АЛТ, АСТ, общий билирубин	Увеличение при динамическом наблюдении

Синдром низкого сердечного выброса Управление гемодинамикой

Трехкомпонентная стратегия управления
сердечным выбросом
J. Kirklin, 1974 г.

Производительность сердца определяется тремя
основными детерминантами:

Преднагрузкой — длиной мышечных волокон миокарда
в конце диастолы

Постнагрузкой — величиной сопротивления,
преодолеваемого миокардом во время систолы

Контракtilьностью миокарда

Основные направления терапии: создать оптимальную
преднагрузку, адекватно снизить постнагрузку, повысить
контракtilьность

Адекватная преднагрузка

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200
doi:10.1093/eurheartj/ehw128

ESC GUIDELINES

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Рекомендация

Класс

Уровень

Проба с инфузионной нагрузкой рекомендуется в начале интенсивной терапии, если нет признаков перегрузки объемом. Инфузия не менее 200,0 кристаллоидного раствора за 15 – 30 мин.

I

C

Тест с пассивным подъемом нижних конечностей

Если при подъеме ног на 30 – 40° АД увеличивается более, чем на 20%, рационально выполнение инфузионной нагрузки

Вазодилататоры

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200
doi:10.1093/eurheartj/ehw128

ESC GUIDELINES

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Вазодилататор	Дозировка
Нитроглицерин	Начинать с 10-20 мкг/мин, повышая до 200 мкг/мин
Изосорбида динитрат	Начинать с 1 мг/час, повышая до 10 мг/час
Нитропруссид	Начинать с 0,3 мкг/кг/мин и повышая до 5 мкг/кг/мин

Препарат	В/в болюс	В/в инфузия
Нитроглицерин	50 – 100 мкг	0,1 - 2,5 мкг/кг/мин
Изосорбида динитрат	100 – 200 мкг	0,3 - 2,5 мкг/кг/мин
Нитропруссид Na	-	0,2 - 2 мкг/кг/мин

Инодилаторы

Инотропные препараты с выраженными вазодилатирующими свойствами

- **Добутамин**
- **Ингибиторы фосфодиэстеразы III типа**
- **Левосимендан**

Синдром низкого сердечного выброса

Инотропные препараты

ИНОТРОПНОЕ СРЕДСТВО	АКТИВИЗАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ СРЕДНЕЙ ДОЗИРОВКЕ		
		ИНОТРОПНАЯ	ХРОНОТРОПНАЯ	ВАЗОАКТИВНАЯ
Адреналин	$\alpha_1 \beta_1 \beta_2$	+++	+++	++
Норадреналин	$\alpha_1 \beta_1 (\beta_2 ?)$	+++	+++	++++
Допамин	$\alpha_1 \beta_1$ доф. (β_2)	+++	++	±
Добутамин	$\alpha_1 \beta_1 \beta_2$	+++	+	±
Фенилэфрин	α_1	-	-	++++
Эфедрин	$\alpha_1 \beta_1 \beta_2$	+++	+++	++
Изопротеренол	$\beta_1 \beta_2$	++++	++++	-

Левосимендан

Левосимендан

Избирательно связывается с насыщенным кальцием сердечным тропонином «С»

Стабилизация конформации тропонина С,
сокращение миофибрилл

Продлевается связь поперечных миозиновых мостиков с актином. Увеличивается количество связей в единицу времени

Увеличение силы мышечного сокращения

Левосимендан

Левосимендан

**Открытие АТФ-зависимых калиевых каналов
в гладких мышцах сосудистой стенки**

Расширение вен и артерий

**Снижение пред-
и постнагрузки**

**Снижение
давления в малом
круге
кровообращения**

Инотропы и вазопрессоры

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200
doi:10.1093/eurheartj/ehw128

ESC GUIDELINES

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Рекомендация	Класс	Уровень
Короткий курс инотропа (допамина, добутамина, левосимендана, ингибитора ФДЭ III) может быть рассмотрен в случаях ОН с артериальной гипотонией и/или признаками гипоперфузии тканей	IIb	C
Использование инотропов не показано при отсутствии артериальной гипотонии и гипоперфузии тканей	III	A
Вазопрессоры (норадреналин предпочтительнее допамина) могут быть рассмотрены для пациентов, у которых сохраняется кардиогенный шок, несмотря на инфузию инотропов	IIb	C

**Cochrane
Library**

Cochrane Database of Systematic Reviews

Inotropic agents and vasodilator strategies for the treatment of cardiogenic shock or low cardiac output syndrome (Review)

...сегодня нет надежных и убедительных данных, поддерживающих ту или иную инотропную или вазодилаторную терапию, как решение для снижения летальности у гемодинамически нестабильных пациентов с кардиогенным шоком или синдромом малого сердечного выброса.

...следует подчеркнуть, что существует значимая потребность в крупных, хорошо организованных рандомизированных исследованиях по этой теме, чтобы устранить разрыв между повседневной практикой медицины критических состояний и имеющимися доказательствами.

Schumann J. et al. Inotropic agents and vasodilator strategies for the treatment of cardiogenic shock or low cardiac output syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan 29;1:

Синдром малого сердечного выброса

Использование систем вспомогательного кровообращения

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200
doi:10.1093/eurheartj/ehw128

ESC GUIDELINES

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Рекомендация	Класс	Уровень
При кардиогенном шоке не рекомендуется рутинное использование внутриаортальной баллонной контрпульсации	III	A
Краткосрочное применение устройств вспомогательного кровообращения может быть рассмотрено при кардиогенном шоке (с учетом возраста, сопутствующих заболеваний и состояния ЦНС)	IIb	C

Перипартальная кардиомиопатия

Идиопатическая дисфункция левого желудочка (ФВ < 45%), развившаяся в конце беременности или на протяжении месяца после родов. Специфических тестов нет. Диагноз исключения.

Перипартальная кардиомиопатия

- Точные причины неизвестны. Обсуждается дисбаланс ангиогенеза вследствие ускоренного расщепления **пролактина** до субфрагмента, обладающего ангиостатическим и проапоптогенным действием, вызывающим дисфункцию эндотелия.
- В Европе: 1 случай на 1500-10000 родов.
- У половины пациенток разрешается с полным восстановлением функции левого желудочка.
- Точные данные о летальности неизвестны (2-13%).
- При следующей беременности высока вероятность повторного развития дисфункции левого желудочка.

Перипартальная кардиомиопатия

ESC
European Society
of Cardiology

European Journal of Heart Failure (2019)
doi:10.1002/ejhf.1493

POSITION PAPER

Pathophysiology, diagnosis and management of peripartum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy

Mild PPCM

Moderate PPCM

Severe PPCM

Clinical
presentation

Subacute heart failure
Haemodynamic stability

Acute heart failure
Haemodynamic stability
Respiratory insufficiency

Cardiogenic shock
Haemodynamic instability
Respiratory insufficiency

Bauersachs J. et al. Pathophysiology, diagnosis and management of peripartum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2019 Jul;21(7):827-843. doi: 10.1002/ejhf.1493.

Перипартальная кардиомиопатия легкой степени

European Journal of Heart Failure (2019)
doi:10.1002/ejhf.1493

POSITION PAPER

Pathophysiology, diagnosis and management of peripartum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy

- Терапия ОСН в соответствии с современными международными рекомендациями.
- До родов противопоказаны ингибиторы АПФ. Возможна замена на нитропрепараты.
- Экстренное оперативное родоразрешение в случае ухудшения состояния.
- Бромкриптин (блокатор пролактина) 2,5 мг дважды в сутки на протяжении 2 недель. При тяжелой и умеренной степени — далее 2,5 мг один раз 6 недель.

Тяжелая перипартальная кардиомиопатия

Кардиогенный шок

ESC

European Society
of Cardiology

European Journal of Heart Failure (2019)
doi:10.1002/ejhf.1493

POSITION PAPER

Pathophysiology, diagnosis and management of peripartum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy

- Ранний перевод в экспертный центр.
- По возможности избегать β 1-адреностимуляции.
- Предпочтительно назначение левосимендана (0,1 мкг/кг/мин, 24 часа).
- Раннее решение вопроса об использовании систем вспомогательного кровообращения. Требуется 2-7% пациентов.
- Взвешенный, по возможности отсроченный подход к трансплантации сердца.

Перипартальная кардиомиопатия

Опыт СПЦ при НМИЦ им. В.А. Алмазова

- 13 случаев перипартальной кардиомиопатии
- ФВ ЛЖ: 15 – 38%
- Шесть случаев применения левосимендана
- Три случая применения вено-артериальной ЭКМО (27, 19 и 12 суток)
- Выполнена одна трансплантация сердца
- Умерли две пациентки (летальность — 15,4%)

- «мост к принятию решения»
- «мост к мосту»
- «мост к выздоровлению»
- «мост к трансплантации»

Использование систем ЭКМО в перипартальном периоде

- Вено-артериальное ЭКМО — три случая
- Вено-венозное ЭКМО — один случай

- Все пациентки были отлучены от ЭКМО
- Умерли две пациентки. (летальность — 50%)

Острая сердечная недостаточность кардиогенный отек легких

1	Острая декомпенсация ХСН
2	Отек легких при гипертоническом кризе
3	Кардиогенный отек легких
4	Синдром малого сердечного выброса
5	ОСН при ОКС
6	Правожелудочковая сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность кардиогенный отек легких

Причины развития кардиогенного отека легких в периоперационном периоде

1. Повышение давления в левом предсердии при систолической дисфункции левого желудочка.
2. Повышение давления в левом предсердии при диастолической дисфункции левого желудочка.
3. Повышение давления в левом предсердии при патологии митрального клапана.

Интенсивная терапия венозной легочной гипертензии, связанной с недостаточностью левого желудочка

Основные направления терапии

1. Купирование гипоксемии

- ингаляция кислорода;
- неинвазивная вентиляция легких

2. Вазодилататоры

3. Диуретики

4. Инотропные препараты с вазодилатирующим эффектом

Снижение давления
в левом предсердии

Снижение венозного застоя
в малом круге

Кардиогенный отек легких. Респираторная терапия

European Heart Journal (2016) 37, 2129–2200
doi:10.1093/eurheartj/ehw128

ESC GUIDELINES

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Рекомендация	Класс	Уровень
Ингаляция кислорода при ОЧН показана в случаях, когда $SaO_2 < 90\%$ и $PaO_2 < 60$ мм рт. ст.	I	C
Неинвазивная вентиляция легких должна быть рассмотрена для пациентов с респираторным дистрессом (ЧД > 25 /мин, $SaO_2 < 90\%$) с целью купирования дыхательной недостаточности и снижения риска интубации трахеи	IIa	B
Интубация трахеи должна быть выполнена в случаях, когда дыхательная недостаточность ($PaO_2 < 60$ мм рт. ст., $PaCO_2 > 50$ мм рт. ст.) и ацидоз ($pH < 7,35$) не могут быть купированы неинвазивной вентиляцией	I	C

Легочная гипертензия

Легочная гипертензия

Среднее давление в легочной артерии ≥ 25 мм рт. ст.

Классификация

1. Легочная артериальная гипертензия
2. Легочная гипертензия, обусловленная заболеваниями левых отделов сердца
3. Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких и/или гипоксемией
4. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия
5. Легочная гипертензия с неясными и/или смешанными механизмами

Легочная артериальная гипертензия **10%**

Легочная гипертензия, обусловленная патологией левых отделов сердца **70%**

Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких **10%**

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия **1%**

Легочная гипертензия с неясными и/или смешанными механизмами **9%**

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management

The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA)

У пациентов с легочной артериальной гипертензией риск развития периоперационных осложнений со стороны системы дыхания и сердечно-сосудистой системы достигает 38%.
Летальность — 7%.

«...нужно избегать выполнения хирургических вмешательств пациентам с легочной артериальной гипертензией за исключением тех случаев, когда эти операции абсолютно необходимы»

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management European Heart Journal.- 2014. - Vol. – 35. – P. 2383–2431.

Легочная артериальная гипертензия **10%**

Легочная гипертензия, обусловленная патологией левых отделов сердца **70%**

Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких, **9%**

Легочная гипертензия, обусловленная патологией левых отделов сердца **10%**

Хроническая легочная гипертензия **1%**

Легочная гипертензия с неясными и/или смешанными механизмами **9%**

Легочная артериальная гипертензия

**15-50 случаев на 1 000 000 населения
в Европе.**

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the task force for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension of the European society of cardiology (ESC) and the European respiratory society (ERS) // European Heart Journal . – 2009. – Vol. 30, №20. – P. 2493 – 2537.

**Международный регистр беременности при
сопутствующей легочной артериальной
гипертензии, 2007 – 2010 г.**

26 случаев, 15 операций кесарева сечения.

Jais X., Olsson K.M., Barbera J.A. // Pregnancy outcomes in pulmonary arterial hypertension in the modern management era // European Respiratory journal. – 2012. – Vol. 40. – P. 881 – 885.

Летальность среди беременных с легочной артериальной гипертензией

Конец XX века: **30-60%**

Weiss B. M., Zemp L., Seifert B., Hess O.M. Outcome of pulmonary vascular disease in pregnancy: a systematic overview from 1978 through 1996 // Journal of the American College of Cardiology. – 1998. – Vol. 31, № 7. – P. 1650 – 1657.

Первая декада XXI века: **12-33%**

Bedard E., Dimopoulos K., Gatzoulis M. Has there been any progress made on pregnancy outcomes among women with pulmonary arterial hypertension? // European Heart Journal. – 2009. – Vol. 30, №3. – P. 256 – 265.

Летальность при хирургических вмешательствах у пациентов с легочной артериальной гипертензией: **7%**

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management European Heart Journal.- 2014. - Vol. – 35. – P. 2383–2431.

Международные рекомендации

ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy

The Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC)

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension

The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT)

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management

The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA)

GUIDELINES AND CONSENSUS

Statement on pregnancy in pulmonary hypertension from the Pulmonary Vascular Research Institute

Anna R. Hemnes,¹ David G. Kiely,² Barbara A. Cockrill,³ Zeenat Safdar,⁴ Victoria J. Wilson,⁵ Manal Al Hazmi,⁶
Ioana R. Preston,⁷ Mandy R. MacLean,⁸ Tim Lahm⁹

Hemnes A.R., Kiely D.G., Cockrill B.A. et al. Statement on pregnancy in pulmonary hypertension from the Pulmonary Vascular Research Institute//
Pulm Circ. – 2015. - Vol.5, №3.- P. 30, №3. – P. 256 – 265.

Международные рекомендации

Рекомендации	Класс
Женщинам с легочной гипертензией необходимо рекомендовать избегать беременность	III
Периоперационный период у пациентов с тяжелой ЛАГ должен проходить в специализированных центрах.	I
Ранее начатая ЛАГ-специфическая терапия должна быть продолжена во время беременности. Пациентка должна быть предупреждена о возможных тератогенных эффектах	IIa
При плановых оперативных вмешательствах предпочтение должно отдаваться эпидуральной анестезии	IIa

Опыт специализированного перинатального центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (10.2010 – 10.2020)

Вариант легочной артериальной гипертензии	Число пациентов
Идиопатическая легочная артериальная гипертензия	8 (20%)
Легочная артериальная гипертензия, ассоциированная с врожденными пороками сердца	32 (80%)
Всего	40

Некорригированный врожденный порок сердца

Полые
вены

Легочная
артерия

Аорта

Некорригированный врожденный порок сердца

Опыт специализированного перинатального центра ФГБУ «(НМИЦ им. В.А. Алмазова)» (10.2010 – 10.2020)

Врожденный порок сердца	Число пациентов
ДМЖП	18
Полный AV канал	6
Открытый артериальный проток	3
ДМПП	3
Аорто-легочное соустье	2
Всего	32
Из них с формированием сброса справа налево (синдром Эйзенменгера)	24

**Правый
желудочек**

**Левый
желудочек**

GE Datex-Ohmeda

GENERAL 17 09

CVP 180 PA 300 Art 200

mmHg Contr1
(7)
10/1

mmHg Contr1
124/62
(85)

mmHg
150/93
(115)

Tblood
°C
37.6

Центральное
венозное
давление

Invasive Pressures

ALL

NIBP

Auto
On/Off

Start
Cancel

Recorder

Record
Wave

Stop

Давление
в легочной
артерии

Артериальное
давление

Silence
Alarms

Freeze

Take
Snapshot

Alarms
Setup

Record/
Print

ECG

NIBP

Invasive
Pressures

Normal
Screen

Help

Reset
Case

Trends

Monitor
Setup

Patient
Data

Pulse
Oximetry

Airway
Gas

Others

Декомпенсация предсуществующей дисфункции правого желудочка

Летальность среди беременных с легочной артериальной гипертензией

При легочной артериальной гипертензии, ассоциированной с врожденными пороками сердца, летальность составляет **28%**

Bedard E., Dimopoulos K., Gatzoulis M. Has there been any progress made on pregnancy outcomes among women with pulmonary arterial hypertension? // European Heart Journal. – 2009. – Vol. 30, №3. – P. 256 – 265.

У беременных с синдромом Эйзенменгера летальность достигает **50%**

Ma L., Liu W., Huang Y.. Perioperative management for parturients with pulmonary hypertension: experience with 30 consecutive cases// Front Med. 2012. Vol. 6. №3. P. 307–310.

Опыт специализированного перинатального центра ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» (10.2010 – 10.2020)

Показатель	Среднее значение
Возраст, лет	27 (23; 29)
Срок гестации, нед.	32 (28; 34)
Систолическое давление в легочной артерии, мм рт. ст.	90 (82; 103)
SpO ₂ , %	90 (85; 95)
SpO ₂ у пациенток с синдромом Эйзенменгера, %	87 (78; 93)

Ведущие механизмы декомпенсации состояния пациентов с легочной артериальной гипертензией

Специфическая терапия легочной артериальной гипертензии

Препараты, разрешенные к применению
в Российской Федерации

Сигнальный путь оксида азота
ингибиторы фосфодиэстеразы V типа
силденафил (Ревацио)

Сигнальный путь простагландинов
илопрост (Вентавис)

Сигнальный путь эндотелина I
бозентан (Траклир)
мацитентан (Мацитентан)
амбризентан (Волибрис)

Дооперационный период

Оценка состояния, решение вопроса о возможности продолгования беременности

Катетеризация легочной артерии, тест на обратимость легочной гипертензии (оксид азота, ингаляционная форма илопроста).

6 пациенток (16,7%)

Динамическое наблюдение

ЭхоКГ, SpO₂, NT-proBNP, состояние плода

Интенсивная терапия

В дооперационном пребывании в ОРИТ нуждались **6 пациенток**

Интраоперационный период (36 вмешательств)

- Экстренные вмешательства — **2**
- Плановые вмешательства — **38**

Метод анестезии

- Общая комбинированная анестезия на основе севофлурана в условиях ИВЛ — **1**
- Сочетанная анестезия на основе эпидуральной блокады — **38**
Ропивакаин 7,5 мг/мл, 15-20 мл за 30 – 40 мин.

Интенсивная терапия

- ЛАГ-специфическая терапия в день операции — **36**
- Ингаляция оксида азота — **40**
- Ингаляция илопроста — **3**
- Инотропная терапия — **30**
- Вазопрессоры — **36**. Норадреналин, мезатон.
- Медленное введение окситоцина 2,5 МЕ в час; карбетоцин 100

Запись показателей гемодинамики и оксигенации во время операции кесарева сечения у пациентки с ДМЖП

← Артериальное давление

← ЧСС

← SpO₂

Изменения в послеродовом периоде

Сброс слева направо

Сброс справа налево

Сброс справа налево

Сброс справа налево

Декомпенсация состояния с развитием ПЖСН и/или усугублением гипоксемии отмечено у 31 пациентки. Медиана — **30 (24; 40)** ч после родоразрешения

Клиническое наблюдение 1.

Пациентка 20 лет, ДМЖП, синдром Эйзенменгера.

Клиническое наблюдение 2.

Пациентка 24 лет, открытый аортальный проток, синдром

Эйзенменгера.

Клиническое наблюдение 3.

Пациентка 17 лет, ДМЖП, синдром Эйзенменгера.

Острая сердечная недостаточность

правожелудочковая сердечная недостаточность

1	Острая декомпенсация ХСН
2	Отек легких при гипертоническом кризе
3	Кардиогенный отек легких
4	Синдром малого сердечного выброса
5	ОСН при ОКС
6	Правожелудочковая сердечная недостаточность

Послеоперационный период

- Необходимость в ИВЛ — **4**
- Медиана продолжительности лечения в ОРИТ — **13 (9;22)** суток

Интенсивная терапия

- Комбинация вазодилататоров малого круга — **33**
- Инотропная терапия — **32**. Добутрекс, дофамин, адреналин, левосимендан
- Вазопрессоры — **32**. Норадреналин
- Антибактериальная терапия — **40**
- Подавление лактации (каберголин) — **40**
- Прямые антикоагулянты — **36**

Вазодилататоры малого круга при интенсивной терапии декомпенсации

Оксид азота. Селективный вазодилататор малого круга

ингаляционная терапия

Простагландин I₂ (простациклин). **Илопрост**
Значительное снижение воздействия на большой круг
при ингаляционном введении

ингаляционная терапия

Ингаляция оксида азота

- Ингаляционный путь введения.
- Форма выпуска: баллоны 10 и 40 литров с концентрацией 0,1% (1000 ppm).
- Дозировка: 20 - 60 ppm (part per million).
- Редуктор → ротаметр → контур.

Газоанализатор (NO, NO₂)

- Может использоваться как при ИВЛ, так и при самостоятельном дыхании

Оксид азота (мл/мин) = доза (ppm) × МОВ (мл)/1000

Ингаляция илопроста

Илопрост. Синтетический аналог простаглицлина (простаглицлин I₂).

Вентавис. Форма илопроста для ингаляционного введения. Маловыраженное влияние на большой круг.

Время полувыведения — 25 минут, продолжительность действия — 1 час.

Дозировка: ингаляции 10 – 20 мкг. (2,5 - 5 мкг в альвеолах)

6-9 раз в сутки.

При внутривенном введении илопроста допустимая скорость инфузии — 0,5-2 нг/кг/мин, т.о. возможна

ингаляция 10 мкг (2,5 мкг в альвеолах) каждые 30 мин.

ДЛА

Илопрост 20 мкг

Место включения	Y-коннектор	После увлажнителя	До увлажнителя
Доля препарата, %	14.5 ± 1.0	16.8 ± 2.6	33.3 ± 3.6

Ari A., Areabi H., Fink J. Evaluation of aerosol generator devices at 3 locations in humidified and non-humidified circuits during adult// *Respir Care.*- 2010. – Vol. 55. - P.837– 844

Послеоперационный период

Клиническое наблюдение

Пациентка 17 лет, беременность 28 нед., ДМЖП, синдром Эйзенменгера.

Абдоминальное
родоразрешение

Гемотрансфузия
2 доз эр. взвеси

Результаты

- Умерли четыре пациентки (**10%**) на 0, 9, 14 и 15 сутки. Причины смерти — критическая гипоксемия (2), фатальная недостаточность правого желудочка (1), ТЭЛА (1).
- Летальность в подгруппе ВПС — **4/32 (12,5%)**.
- Летальность в подгруппе с-ма Эйзенменгера — **4/24 (16,7%)**

- Выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии 37 детей (**92,5%**)
- Прерывание беременности на сроке 18 недель путем операции малого кесарева сечения: **1**
- Антенатальная гибель плода с последующим родоразрешением путем операции кесарева сечения: **1**
- Смерть ребенка в возрасте 7 дней: **1**

Обеспечение постоянной готовности систем ЭКМО при родоразрешении беременных с легочной артериальной гипертензией

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ и РЕАНИМАТОЛОГИЯ

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2016

УДК 617-89.5:618.5-089.888.61-06:616.131-008.331.1

Баутин А.Е., Якубов А.В., Коконина Ю.А., Ильин А.Б., Ли О.А.,
Иртюга О.Б., Мазурок В.А., Зазерская И.Е., Моисеева О.М.

**АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ С ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ**

*ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр»
Минздрава РФ, 197341, Санкт-Петербург*

Анестезиология и реаниматология. - 2016. - Т. 61. № 6. С. 455-461

Оригинальные статьи (клинические исследования)

УДК 616-007-053.1

**БАУТИН А. Е., ЯКУБОВ А. В., АРАМ-БАЛЫК Н. В.,
ГОГИЧАЕВА З. Р., АЛЕКСЕЕВА Ю. А., ЛИ О. А.,
КОКОНИНА Ю. А., ИРТЮГА О. Б.,
ЗАЗЕРСКАЯ И. Е., МОИСЕЕВА О. М.**

**О возможном влиянии состояния малого круга кровообращения
на развитие тромбоцитопении у беременных
с врожденными пороками сердца**

*Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова
197341, Россия, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
e-mail: abautin@mail.ru*

Баутин А. Е., Якубов А. В., Арам-Балык Н. В., Гогичаева З.Р., Алексеева Ю.А., Ли О.А., Коконина Ю.А., Иртюга О.Б., Зазерская И.Е., Моисеева О.М. О возможном влиянии состояния малого круга кровообращения на развитие тромбоцитопении у беременных с врожденными пороками сердца. Регионарное кровообращение и микроциркуляция – 2017. - №2(62). - С. 36 - 43.

**АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ
С ТЯЖЁЛОЙ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ**

**В. А. Кудлачев, Ю. А. Побединцева, А. Е. Баутин, Ю. А. Коконина,
Н. С. Гончарова, О. Б. Иртыга, О. М. Моисеева**

**ANESTHETIC MANAGEMENT AND INTENSIVE CARE
IN THE PERIOPERATIVE PERIOD OF ABDOMINAL DELIVERY
IN PATIENTS WITH SEVERE PULMONARY HYPERTENSION**

**V. A. Kudlachev, Yu. A. Pobedintseva, A. E. Bautin, Yu. A. Kokonina,
N. S. Goncharova, O. B. Irtyuga, O. M. Moiseeva**

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова»,
г. Санкт-Петербург

Кудлачев В. А., Побединцева Ю. А., Баутин А. Е. и др. Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия в периоперационном периоде абдоминального родоразрешения у пациентки с тяжелой легочной гипертензией // Вестник анестезиологии и реаниматологии. - 2014. - Т. 11, № 5. – С. 62 – 66.

УДК 618.2-089.5-085.61612-022.6-007.2

Код специальности ВАК: 14.01.20; 14.01.01; 14.01.05

ТАКТИКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА. АНАЛИЗ СЕРИИ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

А.Е. Баутин, Н.В. Арам-Балык, В.А. Мазурок, А.В. Якубов, А.С. Бобкова, Н.В. Бадалян, Ю.А. Коконина, О.А. Ли, О.Б. Иртюга, И.Е. Зазерская, О.М. Моисеева,
ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», г. Санкт-Петербург

Баутин Андрей Евгеньевич – e-mail: abautin@mail.ru

Баутин А.Е., Арам-Балык Н.В., Мазурок В.А., Якубов А.В., Бобкова А.С., Бадалян Н.В., Коконина Ю.А., Ли О.А., Иртюга О.Б., Зазерская И.Е., Моисеева О.М. Тактика анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии у беременных с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца. Анализ серии клинических наблюдений // Медицинский Альманах - 2017. - № 3. - С. 137-143.

PP03

One-centre experience in the Intensive care and anaesthetic management in pregnancy of a patient with pulmonary arterial hypertension

Andrey Bautin, A Yakubov, N Aram-Balik, J Kokonina, O Li, O Irtyuga, I Zazerskaya, O Moiseeva

Almazov North-West Federal Medical Research Centre, Department of Anaesthesiology, Saint Petersburg, Russian Federation

European Association of
Cardiothoracic Anaesthesiology

Berlin

April 19-21

2017

Bautin A., Yakubov A., Aram-Balik N., Kokonina J., Li O., Irtyuga O., Zazerskaya I., Moiseeva O. One-centre experience in the Intensive care and anaesthetic management in pregnancy of a patient with pulmonary arterial hypertension// Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 31 (2017) S19–S20 DOI: 10.1053/j.jvca.2017.02.084.