Кардиомиопатии

И.В. Жиров

Отдел сердечной недостаточности
и заболеваний миокарда

Кардиомиопатии — это заболевания, при которых поражение миокарда, сопровождающееся его дисфункцией, является первичным процессом, а не следствием ИБС, АГ, пороков сердца, перикардитов, болезней легких

Этиология:

- первичные (поражение миокарда неизвестной причины)
- вторичные (причина заболевания известна или связана с поражением других органов)

Классификация (ВОЗ 1995 г.)

Первичные

- Дилатационная (ДКМП)
- Гипертрофическая (ГКМП)
- Аритмогенная правожелудочковая дисплазия
- Рестриктивная (облитерирующая)

Вторичные

- Гипертоническая
- Клапанная
- Ишемическая
- Вследствие системного заболевания
- Воспалительная

Классификация КМП АНА, 2006

Кардиомиопатии

Первичные

Вторичные

Генетические

Смешанные

Приобретенные

ГКМП

АДПЖ

ДКМП

Воспалительная
(миокардит)

Стресс-индуцированная
(takotsubo)

Перипартальная

КМП, индуцированные
тахикардией

КМП у детей, матери
которых больны ИЗСД

Некомпактный
миокард ЛЖ

Гликогеноз

Каналопатии

Митохон-
дриальные
КМП

Рестриктивная
негипертрофическая
КМП

Классификация КМП ESC, 2007

Виды кардиомиопатий

Норма

ДКМП

ГКМП

РКМП

HCM

DCM

HCM

RCM

EMF (OCM)

Adapted from Davies M. Heart 2000;83:469-474

Что такое дилатационная кардиомиопатия?

Кардиомиопатия — характеризуется увеличением одного (левого) или обоих желудочков сердца, систолической дисфункцией и нормальной толщиной стенок ЛЖ

Первичная ДКМП

ДКМП

Воспалительная

Семейная

Идиопатическая.
В 20-50% случаев
в основе лежат
генетические
нарушения

ДКМП

Норма

ДКМП

Распространенность: 1:2500

Третья по частоте причина ХСН

Самая частая причина трансплантации сердца

Чаще болеют мужчины

СЕМЕЙНЫЕ ДКМП

И.В. Жиров, 2021

Формы семейной ДКМП

- Аутосомно-доминантные формы
- Митохондриальные формы
- Аутосомно-рецессивные формы
- X-сцепленные формы

Молекулярная патофизиология ДКМП различна

изучены некоторые механизмы, вызывающие ДКМП для ряда генов:

Приобретенные ДКМП

- Воспалительные
 - наиболее частая причина — вирусный миокардит
- Токсические
 - алкогольная
 - медикаментозные воздействия (антрациклины, доксорубицин и др.), тяжёлые металлы (кобальт, ртуть, мышьяк, свинец)
- Аутоиммунные заболевания, включая системные заболевания соединительной ткани
- Нейромышечные заболевания (мышечные дистрофии Дюшенна/Беккера и Эмери-Дрейфуса)
- Метаболические, эндокринные, митохондриальные заболевания, нарушения питания (дефицит селена, карнитина, тиамина)
- Послеродовая (перипартальная)
- Тахикардией-индуцированная

Патогенез постмиокардитической ДКМП

Схема стадийности развития ДКМП

Mason J.W. Cardiovascular Research 2003; 60: 5–10.

ДИАГНОСТИКА ДКМП

И.В. Жиров, 2021

Диагностика ДКМП

Симптомы и признаки, характерные только для ДКМП, отсутствуют
Обследование направлено на исключение других причин ХСН и выявление этиологии ДКМП

Диагностические критерии ДКМП

Структурно-функциональные нарушения:

ФВ ЛЖ < 45%

Конечно-диастолический диаметр ЛЖ > 117% скорректированной по возрасту и площади поверхности тела

Критерии исключения:

АГ (>160/100 мм рт.ст.)

ИБС (>50% стеноз в основной артерии)

Хроническое злоупотребление алкоголем (> 40 г/день для женщин и > 80 г/день для мужчин)

Системные заболевания

Болезни перикарда

Врожденные дефекты

Легочное сердце

Клиническая картина ДКМП

- Симптомы: сердцебиение, обмороки, слабость, одышка, снижение переносимости физических нагрузок, внезапная сердечная смерть.^{1,2}
- Клинически ДКМП проявляется тремя основными синдромами:
 - 1) Систолической ХСН с признаками застоя крови в малом и большом кругах кровообращения
 - 2) Нарушениями ритма и проводимости
 - 3) Тромбоэмболическими осложнениями (ТЭЛА и эмболия в артерии большого круга кровообращения)

• Внезапная смерть может наступить до развития ХСН.³

References: ¹. Mestroni L, Maisch B, McKenna WJ, et al. Guidelines for the study of familial dilated cardiomyopathies. *European Heart Journal* 1999;20, 93-102. ². Luk A, Ahn E, Soor GS, et al. Dilated cardiomyopathy: a review. *J Clin Pathol*. 2009;62:219-25. ³ Meune C, Van Berlo JH, Anselme F, et al. Primary prevention of sudden death in patients with lamin A/C gene mutations. *N Engl J Med* 2006;354:209 -10.

Физикальное обследование

Осмотр:

- Признаки ХСН

ЭКГ:

- Нет специфических признаков. Может быть снижение вольтажа R, нарушения ритма и проводимости, неспецифические изменения ST и T. При обширном фиброзе ЛЖ может регистрироваться зубец Q — имитация переднего ИМ

Рентгенография органов грудной клетки

- Признаки кардиомегалии
 - Сглаженность контуров левых отделов сердца
 - Признаки артериальной и венозной легочной гипертензии, расширение корней легких

Эхокардиография

- Снижение ФВ ЛЖ

Значительная дилатация всех камер сердца при нормальной или уменьшенной толщине стенок

■ Легочная гипертензия

■ Диссинхрония миокарда (по данным тканевой миокардиальной доплер-эхокардиографии)

Радионуклидные методы

Могут использоваться при технических проблемах с ЭХОКГ: оценка размеров камер сердца, сократимости левого и правого желудочков, диссинхронии, очаговых изменений. Дифференциальный диагноз с ИБС. Использование МИБГ позволяет провести раннюю диагностику зон поражения и выполнить биопсию из этих зон

МРТ и МСКТ

1. Дифференциальная диагностика с другими кардиомиопатиями: АДПЖ, эндокардиальным фиброэластозом, амилоидозом, саркоидозом, миокардитом, между инфильтративной и воспалительной КМП
2. Выявление пациентов с высоким риском внезапной смерти (с обширными зонами фиброза)

КВГ

Выявляются интактные артерии. Инвазивное измерение параметров гемодинамики

Лабораторные тесты при подозрении на ДКМП

- СОЭ
- КФК
- Серологические вирусные реакции (при остром развитии)
- Печеночные пробы
- Сывороточное железо, трансферрин
- Оценка функции щитовидной железы
- По специальным показаниям:
 - Определение в крови: аутоантител, карнитина, лактата/пирувата, селена, ацилкарнитиновый профиль, транскетолазы (бери-бери), маркеров ВИЧ, гепатита С, энтеровирусов, наркотических веществ
 - Определение в моче: органических кислот, аминокислот
 - Биопсия скелетных мышц
 - Биопсия эндокарда

Эндомиокардиальная биопсия

- Проведение дифференциального диагноза со вторичными КМП, исключение гигантоклеточного и лимфоцитарного миокардита
- Определение наличия воспаления в миокарде и персистенции вирусов — определение дальнейшей тактики лечения

Норма

ДКМП

Потеря миофибрилл миоцитами
и пустые пространства в цитоплазме

Недостатки «Далласских» критериев

Противоположные заключения разных экспертов.
Противоречия с другими маркерами вирусной инфекции и иммунного воспаления в сердце. Противоречия с исходом лечения

Иммуногистохимический метод:

Позволяет провести количественную и качественную оценку воспалительных клеток, в первую очередь Т-лимфоцитов.

Наличие > 14 лейкоцитов/ мм^2 , особенно Т-лимфоцитов или активированных Т-клеток и/или скопления Т-лимфоцитов (CD3^+ , CD68) свидетельствует о наличии воспаления ($> 7 \text{ CD3}^+$ в мм^2 или 2 в поле зрения)

Diagnosis of Myocarditis Death of Dallas Criteria

Kenneth L. Baughman, MD

(*Circulation*. 2006;113:593-595.)

© 2006 American Heart Association, Inc.

Распространенность различных вирусов при ПЦР в биоптатах миокарда у пациентов с ДКМП

Парвовирус В19

Открыт в 1970-х годах Y. Cossart в донорской крови. Затем выделен у детей с преходящим апластическим кризом на фоне серповидноклеточной анемии, а также у детей с «пятой болезнью».

Клинические проявления:

В большинстве случаев инфицирование происходит в детском возрасте. 50% детей в возрасте 15 лет имеют специфические антитела к PVB19.

Чаще всего инфицирование протекает бессимптомно или проявляется в виде «пятой болезни»

У взрослых — артропатия

У пациентов с серповидноклеточной болезнью — преходящий апластический криз

При врожденном или приобретенном иммунодефиците — персистирующая вирусемия и аплазия красного ростка

Водянка плода

Описаны несколько случаев острого вирусного миокардита и гепатита у детей

Длительное время может персистировать в различных тканях (суставах, печени, кожи)

Предикторы прогрессирования миокардита в кардиомиопатию и неблагоприятного прогноза

Прогностическая ценность ЭКГ критериев при ВКМП

Predictors of Outcome in Patients With Suspected Myocarditis

Ingrid Kindermann, MD; Michael Kindermann, MD; Reinhard Kandolf, MD; Karin Klingel, MD; Burkhard Bültmann, MD; Thomas Müller; Angelika Lindinger, MD; Michael Böhm, MD

Прогностическое значение определения вирусов в миокарде

Predictors of Outcome in Patients With Suspected Myocarditis

Ingrid Kindermann, MD; Michael Kindermann, MD; Reinhard Kandolf, MD; Karin Klingel, MD; Burkhard Bültmann, MD; Thomas Müller; Angelika Lindinger, MD; Michael Böhm, MD

Predictors of Outcome in Patients With Suspected Myocarditis

Ingrid Kindermann, MD; Michael Kindermann, MD; Reinhard Kandolf, MD; Karin Klingel, MD; Burkhard Bültmann, MD; Thomas Müller; Angelika Lindinger, MD; Michael Böhm, MD

Yuan et al, Am J Physiol Heart Circ Physiol 2004; 286: H83-90

NO. AT RISK

Beta blocker	103	62	22	10
No beta blocker	77	53	25	15

Алгоритм лечения больного ДКМП

ЭНДОМИОКАРДИАЛЬНАЯ БИОПСИЯ

≥ 14 Лфц и Мф/мм²
ПЦР на кардиотропные вирус «+»
= вирус-положительный ВКМП

< 14 Лфц и Мф/мм²
ПЦР на кардиотропные вирус «+»
= Хроническая вирусная КМП

≥ 14 Лфц и Мф/мм²
ПЦР на кардиотропные вирус «-»
= ВКМП

< 14 Лфц и Мф/мм²
ПЦР на кардиотропные вирус «-»
= ДКМП

Стандартная симптоматическая терапия ХСН

Специфическая противовирусная терапия

Иммunosupрессивная терапия
Иммунотуодуляторы?
Иммуносорбция

Лечение ДКМП

1. Лечение сердечной недостаточности!
Проводится по общим стандартам
2. Иммуносупрессивная терапия
3. Иммуномодулирующая терапия (пентаглобин)
4. Противовирусная (валцикловир, фамцикловир, интерфероны)
5. Немедикаментозное лечение:
 - РСТ и/или ИКД
 - Хирургические методы лечения
 - Иммуносорбция?
 - Клеточная терапия?

Ключевые исследования при HFrEF

СС – сердечно-сосудистый; гЧН – госпитализация по поводу сердечной недостаточности; HFrEF – сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса

1. SOLVD Investigators. N Engl J Med 1991;325:293–302; 2. CIBIS-II Investigators. Lancet 1999;353:9–13; 3. Granger et al. Lancet 2003;362:772–6; 4. McMurray et al. Lancet 2003;362:767–71; 5. Swedberg et al. Lancet 2010;376:875–85; 6. Zannad et al. N Engl J Med 2011;364:11–21; 7. McMurray et al. N Engl J Med 2014;371:993–1004

SOLVD-Treatment: эналаприл для лечения пациентов с HFrEF

SOLVD-Treatment	
Вмешательство	Эналаприл 2,5-20 мг* vs плацебо*
Количество пациентов	2,569
Средний возраст (лет)	61
Женщины (%)	19.7
ФВ ЛЖ	≤35%
Первичная конечная точка	Смерть от всех причин
Длительность наблюдения (мес.)	41.4

* в дополнение к стандартной терапии СН

СН — сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка;
COP — снижение относительного риска

SOLVD Investigators. N Engl J Med 1991;325:293–302

CIBIS-II: бисопролол для пациентов с HFrEF

CIBIS-II	
Вмешательство	Бисопролол 1,25-10 мг* vs плацебо*
Количество пациентов	2,647
Средний возраст (лет)	61
Женщины (%)	20
ФВ ЛЖ	≤35%
Первичная конечная точка	Смерть от всех причин
Длительность наблюдения (мес.)	1.3

* в дополнение к стандартной терапии СН

СН — сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка;
COP — снижение относительного риска

EMPHASIS-HF: эплеренон для пациентов с HFrEF

EMPHASIS-HF	
Вмешательство	Эплеренон 50 мг* vs плацебо*
Количество пациентов	2,737
Средний возраст (лет)	68.7
Женщины (%)	22.3
ФВ ЛЖ	≤35%
Первичная конечная точка	Совокупная частота случаев СС-смерти и госпитализаций по поводу СН
Длительность наблюдения (мес.)	21

* в дополнение к стандартной терапии СН

СН — сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка;
СС — сердечно-сосудистый; COP — снижение относительного риска

Альдостерон запускает механизмы внезапной сердечной смерти

- 35-50% смертности от сердечной недостаточности ежегодно связано с желудочковыми аритмиями
- Электрическая нестабильность — основная характеристика миокарда при сердечной недостаточности

Рекомендации по лечению желудочковых нарушений ритма у больных ХСН

Выявление и коррекция потенциальных усугубляющих/провоцирующих факторов (например, электролитные нарушения, проаритмические препараты, ишемия миокарда) у больных с желудочковыми нарушениями ритма	IIa	C
Бета-блокаторы, АМКР и сакубитрил/валсартан снижают риск внезапной смерти и рекомендованы пациентам с ХСН со сниженной ФВ ЛЖ и желудочковыми аритмиями	I	A
Имплантация КВД или СРТ-Д рекомендованы для отдельных групп пациентов с ХСН и сниженной ФВЛЖ	I	A
Должны быть рассмотрены возможные стратегии лечения аритмий у пациентов с КВД (или у пациентов с отсутствием показаний к КВД), в том числе оптимизация фармакологического лечения СН, амиодарон, катетерная абляция и СРТ	IIa	C
Рутинное использование антиаритмических препаратов не рекомендовано у пациентов с СН и бессимптомными желудочковыми нарушениями ритма в связи с риском ухудшения СН, смерти и проаритмическими эффектами препаратов	III	A

Исследование PARADIGM-HF: первичная конечная точка

PARADIGM-HF	
Вмешательство	ARNI 200 мг* vs эналаприл 10 мг*
Количество пациентов	8442
Средний возраст (лет)	63.8
Женщины (%)	21.7
ФВ ЛЖ	≤40%
Первичная конечная точка	Совокупная частота случаев СС-смерти и госпитализаций по поводу СН
Длительность наблюдения (мес.)	27

* в дополнение к стандартной терапии СН

СН — сердечная недостаточность; ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; СС — сердечно-сосудистый; NNT (number needed to treat) — коэффициент эффективности лечения; ОР — отношение рисков; ДИ — доверительный интервал; ARNI (angiotensin receptors/neprilisine inhibitor) — ингибитор рецепторов ангиотензина и неприлизина

Хирургические методы лечения

- Трансплантация сердца
 - Частичная вентрикулэктомия (операция Батисты)
 - Экстракардиальный сетчатый каркас
 - Искусственный левый желудочек

Вентрикулопластика (операция Батиста, модификация по Дору)

Высокая смертность

Экстракардиальные каркасы (CorCar, Pacacor)

Может сочетаться
с пластикой или
протезированием клапанов

Искусственный левый желудочек

- « ... в специальных исследованиях доказано, что постановка ИЛЖ **значимо улучшает прогноз** больных с критической ХСН (уровень доказанности В). По своей эффективности (влиянию на выживаемость) метод имплантации ИЛЖ **превосходит все терапевтические** методы лечения..»

Российские рекомендации по лечению ХСН (третий пересмотр), 2009

Срок нахождения ИЛЖ в организме — до 7 лет

Через 5 дней

Через 520 дней

Годичная выживаемость после имплантации ИЛЖ

Уровень 1 — пациенты с критической гипотензией, несмотря на инотропную и вазопрессорную поддержку — **65%**

Уровень 2 — пациенты, хронически зависящие от инотропной стимуляции — **72%**

Годичная выживаемость после имплантации ИЛЖ

Уровень 3 — пациенты с развитием полиорганных поражений при попытке прекращения инотропной стимуляции

82%

Уровень 4 — пациенты, требующие неуклонного повышения доз диуретиков вследствие задержки жидкости —

75%

Долгосрочная эффективность ИЛЖ. Смертность

Перипартальная кардиомиопатия

Определение

ПКМП — идиопатическая кардиомиопатия, при которой сердечная недостаточность связана с систолической дисфункцией ЛЖ, развивающейся в последние месяцы беременности или первые месяцы после родов. При этом другая причина СН отсутствует. Дилатация ЛЖ может отсутствовать, однако ФВЛЖ почти всегда менее 45%

ПРИЧИНЫ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

Частота выявления ССЗ у беременных — 0,4-4,7%

Гипертоническая болезнь — 7-30%

Нарушения ритма сердца — 18,3%

Острый коронарный синдром — 3-6 : 100 тыс.

Перипартальная кардиомиопатия — 1: 3000-4000

Заболееваемость ПКМП

Гаити — 1:300¹

США — 1:2500-4000²

- 80% афроамериканки
- 20% белые
- практически полное отсутствие у латиноамериканцев

1. Fett et al., 2005

2. Chapa et al., 2005

Заболееваемость ПКМП

ЮАР — 1:1000

Нигерия — 13%

Заболееваемость ПКМП

Индия — 1:1374

Россия — ?

Факторы риска ПКМП

- *Возраст*
- *Количество беременностей и родов*
- *Многоплодная беременность*
- *Гестационная АГ. Частота гестационной артериальной гипертензии от 8-10% до 43%*
- *Преэклампсия. Диагностируется у 22%*
- *Этническое представительство*
- *Генетическая предрасположенность*
- *Токолитическая терапия*
- *Употребление кокаина*

Патогенез ПКМП

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС

КАТЕПСИН D

ПРОЛАКТИН

Патогенез ПКМП

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС

- Повышение количества активных форм O_2 (свободных радикалов) повреждение белков, липидов, углеводов, ДНК, мембранных структур клеток, эндотелия
- Нарушение метаболизма кардиомиоцитов
- Дисбаланс между оксидантной и антиоксидантной системами

Пролактин

- Основная функция пролактина — обеспечение лактации
- Пролактин синтезируется и выделяется лактотропными клетками передней доли гипофиза
- Секреция гипофизом пролактина контролируется дофаминергической системой гипоталамуса
- Уровень пролактина непостоянен и у небеременных женщин колеблется от 4,0 до 25,0 мкг/л
- В период беременности пролактин достигает пика и доходит до 250 мкг/л, что в 20 раз превышает его значения до беременности
- После родов пролактин способствует лактации и выделению молока

Пролактин

2 формы

Общий пролактин
23 кДа

Способствует
ангиогенезу и
пролиферации
клеток

Фрагмент
16 кДа

Подавляет ангиогенез
Вызывает вазоспазм
и апоптоз
Вызывает дисфункцию
кардиомиоцитов

Основной патогенетический механизм ПКМП

Формирование «смертельного каскада»

в момент максимальной уязвимости
антиоксидантной системы

Окислительный стресс

Активация катепсина D
в КМЦ

Образование 16 kDa
фрагмента пролактина

Триггерный механизм

Активированный
катепсин D разрушает
молекулу пролактина

Физиологически
неактивная форма,
обладающая негативным
действием

16 kDa фрагмент пролактина

Формирование эндотелиальной
дисфункции и разрушение уже
образованных капиллярных сетей

16 kDa фрагмент пролактина

Усиление вазоконстрикторного ответа
и нарушение функции КМЦ

Патогенез ПКМП

ИНФЕКЦИЯ

ВОСПАЛЕНИЕ

АУТОИММУННЫЕ
ПРОЦЕССЫ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕН
НОСТЬ

Инфекция

- При проведении биопсии у 26 пациенток в 30,7% случаев обнаружен геном различных вирусов: парвовирус В19, вирус герпеса 6, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус

В контрольной группе ($n = 33$) в 30,3% случаев были выделены те же вирусы

- Изучалась также связь с хламидиями, вирусами Коксаки, гриппа А и В

Bültmann BD et al. High prevalence of viral genomes and inflammation in peripartum cardiomyopathy., Am J Obstet Gynecol. 2005 Aug; 193(2):363-5.

Cénac A et al. Are anti-Chlamydia pneumoniae antibodies prognosis indicators for peripartum cardiomyopathy?, J J Cardiovasc Risk. 2003 Jun; 10(3):195-9

Воспаление

- В ряде исследований у женщин с ПКМП были выявлены повышенные плазменные уровни маркеров воспаления:

фактор некроза опухоли

интерферон

интерлейкин 6

С-реактивный белок

Являются маркерами прогноза, а не патогенетическими факторами

Аутоиммунные процессы

- При ПКМП определяется высокий титр ауто-антител в сыворотке (не обнаруженный у женщин с дилатационной КМП)
- Возникает благодаря транспорту клеток гемопоэза (химеризм) от плода к матери, который увеличивается при многоплодной беременности и каждой последующей

Ansari AA, et al. Autoimmune mechanisms as the basis for human peripartum cardiomyopathy. Clin Rev Allergy Immunol. 2002 Dec; 23(3):301-24.

Warrach RS, Sliwa K, et al. Impact of pregnancy-related heart failure on humoral immunity: clinical relevance of G3-subclass immunoglobulins in peripartum cardiomyopathy. Am Heart J. 2005 Aug; 150(2):263-9.

Генетическая предрасположенность

- Среди 110 женщин из 520 семей с семейной ДКМП было выявлено 45 случаев ПКМП (США)

- В исследовании 90 семей с семейной ДКМП у 5 пациенток диагностирована ПКМП (Нидерланды)

В настоящее время доказательств недостаточно.
Большее влияние оказывают факторы внешней среды.

Morales A, Rare variant mutations in pregnancy-associated or peripartum cardiomyopathy. Circulation. 2010 May 25; 121(20):2176-82

van Spaendonck-Zwarts K et al Peripartum cardiomyopathy as a part of familial dilated cardiomyopathy. Circulation. 2010 May 25; 121(20):2169-75.,

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Клинические проявления являются
чрезвычайно варибельными

Прогрессирование симптоматики вплоть до
развития конечной стадии ХСН может
происходить в течение нескольких суток

Одновременно с этим возможно
спонтанное и полное восстановление
функции левого желудочка

Все эти характеристики являются уникальными для ПКМП

Диагностика

- Перипартальная кардиомиопатия — диагноз исключения
- Пациенты имеют обычно повышенный уровень натрийуретических пептидов
- ЭХО КГ не только для подтверждения диагноза, но и с целью определения прогноза
- МРТ не является необходимым исследованием, проводится для получения дополнительной информации, не доступной ЭХО КГ
- Эндомиокардиальная биопсия не имеет диагностического и прогностического значения для ГКМП. Проводится с целью исключения развития острого миокардита.

Дифференциальная диагностика ПКМП

- Ключевой критерий диагностики — ПКМП **не является** следствием ДКМП, существовавшей до беременности и развитие симптомов СН не связано с гемодинамической перегрузкой

Дифференциальная диагностика ПКМП

1. Предшествующая ДКМП (семейная или несемейная), обострившаяся на фоне беременности
2. СН на фоне клапанных пороков
3. Гипертензивная СН
4. Миокардит
5. Инфаркт миокарда у беременных
6. Венозные тромбозы и эмболии

Зависимость прогноза и этиологии кардиомиопатий

Прогноз

- 6-мес смертность — 10-16%
- Смертность в течение 1-10 лет — 4-7%
- Основные причины летальных исходов — внезапная смерть и прогрессирующая сердечная недостаточность
- 18% всех смертей происходит в течение первой недели
- Каждой 10-й женщине с острой ПКМП требуется трансплантация

Circulation 2010;121:1465-1473.

Circulation 2012;126:A18643

J Am Coll Cardiol 2011;58:659-70.

Клинические исходы ПКМП

Исследование I RAS

Клинические исходы ПКМП

Исследование I RAS

Долгосрочный прогноз при ПКМП

1987-2010 годы (Швеция)

272 пациентки с ПКМП, 1341 — группа контроля

Наблюдение — 16,4 года

СМЕРТНОСТЬ

1 год — 4%, 3 года — 5,9%, 5 лет — 5,9%, 10 лет — 7%

Клинические исходы ПКМП

Результаты крупнейшего популяционного исследования в Азии (Тайвань 1997-2011)

$n = 925, 1:2222-1:7692$

Прогноз

- Полное восстановление — 23-41%
- При повторных беременностях риск рецидива ПКМП составляет 30-50%
- В случае нормализации фракции выброса повторная беременность не рекомендуется

Лечение ХСН при ПКМП

- Терапия ХСН по общим принципам ведения пациентов с сердечной недостаточностью
- Пациентки в послеродовом периоде должны принимать терапию в соответствии с рекомендациями по лечению ХСН

Лечение ХСН при ПКМП во время беременности

- **Ингибиторы АПФ и БРА** противопоказаны, так как они обладают тератогенным и нефротоксическим действием на плод.
- Применение **гидралазина и нитратов** длительного действия безопасно.
- **Бета-адреноблокаторы** не обладают тератогенным действием на плод. Предпочтение рекомендуется отдавать селективным бета-адреноблокаторам.
- **Диуретики** (фуросемид и гидрохлортиазид) следует применять с осторожностью, так как они уменьшают плацентарный кровоток.
- **Спиронолактон** противопоказан, так как он обладает антиандрогенным действием, проявляющимся особенно в I триместре беременности. Воздействие эплеренона не изучено при беременности, в связи с чем он не должен применяться
- **Антитромботические средства.** Варфарин применять не следует, так как он обладает фетотоксическим действием. Возможно применение нефракционного и низкомолекулярного гепарина.

Современные подходы к лечению ПКМП

1. Лечение сердечной недостаточности — проводится по общим стандартам
2. Имплантация систем вспомогательного кровообращения — метод выбора при тяжелой ХСН
3. Подавление синтеза пролактина — специфический способ терапии при наличии острой симптоматики ХСН

Бромокриптин

Агонист центральных и периферических допаминовых рецепторов

Ингибирует секрецию пролактина

ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Положительно влияет на АД, ОПСС, уровень эпинефрина

Увеличивает ударный объем, снижает давление наполнения ЛЖ

Снижает уровень окисленных ЛПНП, холестерина, свободных ЖК, триглицеридов

Бромокриптин

Назначение бромокриптина

2,5 мг x 2 раза — 2 недели

2,5 мг x 1 раз — 6 недель

Эффективность бромокриптина при ПКМП

Проспективное рандомизированное исследование.

20 пациенток (бромокриптин 5 мг/сут 2 нед, затем 2,5 мг/сут 4 нед).

Увеличение ФВЛЖ ($p=0,012$), снижение степени митральной регургитации ($p=0,0042$)

Эффективность бромокриптина при ПКМП

	PPCM Bromo Baseline*	PPCM Bromo 6 months*	PPCM Std Baseline*	PPCM Std 6 months	<i>p</i> value
EF, %	28 ± 9	58 ± 11	28 ± 9	26 ± 11	0.006
Mitral ERO, cm2	0.45 ± 0.13	0.11 ± 0.03	0.44 ± 0.18	0.34 ± 0.18	0.02
TDI E' medial, m/sec	7.0 ± 1.3	12.4 ± 2.4	6.5 ± 1.1	7.3 ± 2.5	0.04
TDI E' lateral, m/sec	7.2 ± 1.1	12.4 ± 2.5	6.6 ± 1.0	7.3 ± 2.5	0.02

*Value = mean ± 1 SD

PPCM Bromocriptine, n=10: Mortality 10%

PPCM Standard therapy, n=10: Mortality 40%

Эффективность бромокриптина при ПКМП

« ... в случае неэффективности терапии бромокриптином следует думать о том, что беременность демаскировала генетическую форму кардиомиопатии...»

Пентоксифиллин при ПКМП

открытое проспективное исследование (ЮАР)

	Группа 1, n — 29	Группа 2, n — 30
Терапия	Стандартная	+ пентоксифиллин 400 мг x 3 раза
Возраст	29± 7 лет	33± 5 лет
Н родов	2,6	3,2
ФВ ЛЖ	25± 9%	23± 8%
САД	108± 16 мм рт ст	114± 18 мм рт ст
ЧСС	92± 19	97± 18
Наблюдение 6 месяцев		
улучшение ФК ХСН	60%	93%
ФВ ЛЖ	43± 16%	44± 13%
Летальный исход	8	1
Ком. конечные точки	15	2

Особенности лечения острой сердечной недостаточности при ПКМП

- Назначение бромокриптина
- Профилактика тромбоэмболических осложнений — гепарин
- Препарат первой линии инотропной поддержки — левосимендан (0,1 мг/кг/мин 24 часа)
- Раннее начало механической поддержки

ПКМП с тяжелыми сердечно-легочными нарушениями

Снижение преднагрузки диуретики, вазодилататоры (при САД > 110 мм)

Неинвазивная/инвазивная ИВЛ (при Sp O₂ < 95%)

Инотропная поддержка — левосимендан 0,1 мг/кг/мин 24 ч

Экстренное родоразрешение (кесарево сечение)

Рассмотреть назначение бромокриптина

Рассмотреть механическую поддержку

Стабилизация состояния?

Трансплантация

Прекращение лактации

ПКМП без тяжелых сердечно-легочных нарушений

Дородовый период

Терапия СН

Гидралазин

Нитраты

Бета-блокаторы

Рассмотреть диуретики

Рассмотреть родоразрешение

Послеродовый период

Терапия СН

Ингибиторы АПФ (БРА)

Бета-блокаторы

Спиронолактон

Диуретики

Рассмотреть ивабрадин

Рассмотреть бромокриптин

Рассмотреть имплантацию кардиовертера-дефибриллятора при ФВ ЛЖ $\leq 35\%$

Продолжить терапию ХСН как минимум 12 месяцев после улучшения функции ЛЖ

Имплантация устройств при ПКМП

- Возможна имплантация кардиовертера-дефибриллятора через 6 месяцев после начала заболевания при сохраняющейся тяжелой дисфункции левого желудочка несмотря на оптимальную медикаментозную терапию.
- При наличии показаний — в сочетании с ресинхронизирующей терапией

Определение рестриктивной КМП

Рестриктивные кардиомипатии (РКМП) — это неоднородная группа заболеваний сердца, сопровождающихся повышением жесткости миокарда, приводящим к существенному повышению давления в левом желудочке с незначительным его увеличением в объёме¹.

¹ *European Heart Journal*, 2008, 29, 270-276

Классификация РКМП

Наследственные

- Наследственная с неизвестным геном
- Мутации саркомерных белков:
 - тропонина I (РКМП ± ГКМП);
миозина легких цепей
- Семейный амилоидоз
 - транстиретин (РКМП+нейропатия)
 - аполипопротеин (РКМП+нефропатия)

Десминопатия

- Pseudoxanthoma elasticum
- Гемохроматоз
- Болезнь Андерсона-Фабри
- Гликогеноз

Ненаследственные

- Амилоидоз (AL/преальбумин)
- Склеродермия
- Эндомиокардиальный фиброз:
 - гиперэозинофильный синдром
 - идиопатический
 - вследствие хромосомных aberrаций
 - лекарственный (серотонин, эрготамин, ртуть)
- Карциноидная болезнь сердца
- Метастазы раковых опухолей
- Ионизирующее воздействие
- Радиация
- Воздействие лекарств (антрациклины)

Распределение по возрасту при РКМП

Возраст

Соотношение мужчины/женщины = 37/57

«Проблема» внутри кардиомиоцита (первичные)

- Sarcomeric protein disease
- RAS-MAPK (e.g. Noonan)
- Desminopathy
- Mitochondrial disease

«Инфильтрация» — патологический материал между кардиомиоцитами

«Накопление» — патологический материал внутри кардиомиоцита

Iron

Glycosphingolipid

Glycogen

Гистологическая картина при РКМП

Расширение обоих предсердий при нормальных
размерах желудочков

Выраженный интерстициальный фиброз

Что такое амилоидоз?

Амилоидоз — это группа заболеваний, при которых в одном или нескольких органах наблюдают отложение амилоида — особого белка фибриллярной структуры.

Морфологическая картина амилоидоза

Amyloidosis

Thickening of all 4 chambers

Biatrial dilation

Normal or mildly dilated RV

Normal to small LV

Классификация амилоидоза (ВОЗ, 2003)

Белок амилоида	Белок-предшественник	Клиническая форма амилоидоза
AA	SAA-белок	Вторичный амилоидоз при хронических воспалительных заболеваниях, в т.ч. периодической болезни и синдроме Макла-Уэллса
AL	λ , κ -легкие цепи иммуноглобулинов	Амилоидоз при плазмоклеточных дискразиях – идиопатический, при миеломной болезни и макроглобулинемии Вальденстрема
ATTR	Транстиретин	Семейные формы полинейропатического, кардиопатического и др. амилоидоза, системный старческий амилоидоз
A β ₂ M	β ₂ -микроглобулин	Диализный амилоидоз
AGel	Гелсолин	Финская семейная амилоидная полинейропатия

Классификация амилоидоза (ВОЗ, 2003)

AApoA1	Аполипопротеин А-I	Амилоидная полинейропатия (III тип, по van Allen, 1956)
AFib	Фибриноген	Амилоидная нефропатия
A β	β -белок	Болезнь Альцгеймера, синдром Дауна, наследственные кровоизлияния в мозг с амилоидозом, Голландия
APrP ^{Scr}	Прионовый белок	Болезнь Крейтцфельда-Якоба, болезнь Герстманна-Штраусслера-Шейнкера
AANF	Предсердный натрийуретический фактор	Изолированный амилоидоз предсердий
AIAPP	Амилин	Изолированный амилоидоз в островках Лангерганса при сахарном диабете II типа, инсулиноме
ACal	Прокальцитонин	При медуллярном раке щитовидной железы
ACys	Цистатин С	Наследственные кровоизлияния в мозг с амилоидозом, Исландия

Описательные термины, такие как первичный амилоидоз, вторичный амилоидоз и другие (например, старческий амилоидоз), которые не основаны на этиологии, дают мало полезной информации и больше **не рекомендуются**

Основные типы амилоидоза сердца

AL-амилоидоз имеет критическое значение для его исключения из-за клинической срочности^{1,2}

Механизм AL амилоидоза

Костный мозг

Иммуноглобулин

Легкие цепи

Неправильный фолдинг

Амилоидные фибриллы

- Происходит, когда моноклональные плазматические клетки избыточно производят фрагменты легкой цепи иммуноглобулина, которые неправильно складываются в амилоидные фибриллы
- Наблюдается у людей старше 50 лет²
- Одинаково распространен среди мужчин и женщин²
- Заболеваемость колеблется от 3 до 12,7 случаев на миллион человеко-лет, в зависимости от региона³

Медиана выживаемости нелеченных пациентов с AL-амилоидозом с проявлениями сердечной недостаточности составляет <6 месяцев¹

ATTR-КМП

1. Donnelly J, Hanna M. *Cleve Clin J Med.* 2017;84(12 suppl 3):124-26; 2. Siddiqi OK, et al. *Trends Cardiovasc Med.* 2018;28:10-21; 3. Kholová I, Niessen HW. *J Clin Pathol.* 2005;58(2):125-133

ATTR-КМП является недооцененным и часто неправильно диагностируемым заболеванием¹

Механизм ATTR-КМП 2-4

Печень

Транстиретин (ТТР)

Диссоциация

Неправильный фолдинг

Амилоидные фибриллы

ATTR-КМП: жизнеугрожающее, недооцененное и редко диагностируемое заболевание¹⁻⁴

Типы ATTR-КМП

Распространенность разных типов ATTR-амилоидоза

«Мутантный» тип

- Зависит от географического региона (Европа < 1:1000000¹, Япония < 1:10000000²)
- Эндемические vs неэндемические очаги³

Val30Met → Португалия, Швеция

Leu111Met — Дания

Ile68Leu — Италия

Val122Ile — США, Западная Африка

«Дикий» тип

- Частота при аутопсиях³⁻⁶:
- 25% > 80 лет
- 37% > 95 лет
- 17% — при СНсФВ
- Преимущественно мужчины (70-90%)⁵
- Однако, в когорте лиц с СНсФВ — равное распределение по полу⁷

1 – Ando et al. Orphanet J Rare Dis 2013;8:31; 2 – Kato-Motozaki et al. J Neurol Sci 2008;270:133-146

3 – Ruberg F. et al. JACC 2019 73;22:2872-91. 4 – Maurer et al. Circulation 2017;135:1357-1377

5 – Gonzalez-Lopez et al. Rev Esp Cardiol 2017;70(11):991-1004. 6 – Mohammed et al. JACC Heart Fail 2014;2(2):2014

7 – Gonzales E. Eur Heart J 2015;36:2585-2594.

Задержки в постановке диагноза / неправильная диагностика ATTR-кардиомиопатии

- Ранняя диагностика ATTR-кардиомиопатии является ключевой, поскольку прогноз прогрессирующе ухудшается при накоплении амилоида в органах-мишенях¹
- Задержка в постановке диагноза может быть обусловлена:
 - Низкой настороженностью врачей²
 - Отсутствием патогномоничных симптомов, схожестью клинических проявлений с АГ, ГКМП, аортальным стенозом^{1,2}
 - Болезнь несправедливо считается неизлечимой²

1 – Wileles R. JACC Heart Fail 2019;7:709-716; 2 – Maurer M et al. Circulation 2017;135(14):1357-1377.

Задержки в постановке диагноза / неправильная диагностика АТТН-кардиомиопатии

- Из эпидемиологических исследований известно:
 - 17% пациентов до постановки диагноза посещали как минимум 5 различных специалистов¹
 - Неправильно диагноз был выставлен у 50% пациентов с «мутантным» и у 39% пациентов с «диким» типом АТТН¹
 - 75% пациентов с неправильно выставленным диагнозом получали специфическую терапию по поводу некорректно поставленного диагноза³
- Средняя задержка в постановке диагноза составляет 39 месяцев (8-78 месяцев)²
- У 42% пациентов диагноз выставляется более чем через 4 года после появления первой симптоматики²

Как подтвердить диагноз при подозрении на АТТР-КМП: совокупность признаков

1 Клинические признаки

2 Признаки, полученные при визуализации

3 Лабораторные признаки / биомаркеры

АТТР-КМП: кардиальные проявления заболевания

Типичные признаки и симптомы сердечной недостаточности¹

- Одышка, особенно при физической нагрузке
- Усталость и слабость
- Отек нижних конечностей и асцит
- Непереносимость физической нагрузки

Другие сердечные проявления заболевания^{1,2}

- Нарушение проводимости сердца
 - Предсердные аритмии (например, мерцательная аритмия)
 - Блокада ножек пучка Гиса
 - Полная блокада сердца
- Боль в груди с нормальными коронарными артериями
- Диффузная ишемия миокарда
- Аортальный стеноз у пожилых пациентов
- Псевдоинфарктная картина

«Красные флаги» ATTR-амилоидоза (клиника)

Необъяснимая сердечная недостаточность и

- Непереносимость ИАПФ и БАБ у пациентов с вновь диагностированной ХСН
- Сенсомоторная полинейропатия, прогрессирующая по типу «от дистального к проксимальному» («мутантный» тип)
- Автономная нейропатия (ортостатическая гипотония, сексуальная дисфункция) («мутантный» тип)

Wileles R. JACC Heart Fail 2019; 7: 709-716; Donnelly J. Clin J Med 2017; 84(12 suppl 3):12-26; Nakagawa M. et al. Amyloid 2016 23(1):58-70.

«Красные флаги» ATTR-амилоидоза (клиника)

Необъяснимая сердечная недостаточность и

- Наличие двустороннего синдрома запястного канала (около 50% пациентов с «диким» типом ATTR-амилоидоза)
- Симптомный стеноз позвоночного канала (около 30% пациентов с «диким» типом ATTR-амилоидоза)
- Спонтанный разрыв сухожилия двуглавой мышцы плеча (около 33% пациентов с «диким» типом ATTR-амилоидоза)
- ЖКТ-симптомы (диарея, запоры — наиболее характерны для «мутантного» типа ATTR-амилоидоза)

Амилоидоз сердца

1. Заподозрить наличие амилоидоза сердца
2. Провести дифференциальную диагностику между типами амилоидоза в зависимости от белка-предшественника

Электрокардиограмма (ЭКГ)

Расхождение между толщиной стенки ЛЖ и амплитудой зубцов комплекса QRS^{1,2}

На всем протяжении ЭКГ показывает низкую амплитуду, псевдоинфарктный паттерн в передних и нижних отведениях, слабую прогрессию зубца R.

С разрешения авторов: Edwards A, et al. Cardiac amyloidosis: A case review series. J Integr Cardiol. 2015;1(2):40–45. Copyright © 2015

1. Siddiqi OK, Ruberg FL. Trends Cardiovasc Med. 2018;28(1):10–21; 2. Maurer MS, et al. Circulation. 2017; 135(14):1357–1377; 3. Edwards A, et al. J Integr Cardiol. 2015; 1(2):40–45.

ЭхоКГ-признаки амилоидной кардиомиопатии

- ГЛЖ > 1,2 см и/или низкий вольтаж на ЭКГ
- Бивентрикулярное утолщение стенок ЛЖ и створок клапанов сердца
- Феномен «пареза базальных отделов» (apical sparing)
- Выпот в перикарде при наличии выраженного утолщения стенок ЛЖ

Утолщение стенок ЛЖ на ЭхоКГ

JACC 2010;55:1769-79

Изменения на ЭхоКГ — 2D/3D Imaging

Данные проф Саидовой М.А., 2021

Изменения на ЭхоКГ — Speckle Tracking Imaging

Изменения на ЭхоКГ не позволяют провести дифференциальную диагностику типа амилоидоза

AL-амилоидоз

ATTR-амилоидоз

Магнитная резонансная томография сердца (МРТ)

Пре контраст
T1

Отсроченное
контрастирование
гадолинием

Экстракорпоральный
объём

**Аортальный
Стеноз**

**Амилоидоз
Сердца**

С разрешения авторов Springer Nature Customer Service Centre GmbH, Springer Nature, Heart Fail Rev, Fontana M, Chung R, Hawkins PN, Moon JC. Cardiovascular magnetic resonance for amyloidosis, Heart Fail Rev. 2015 Mar; 20 (2): 133–44

LGE (late gadolinium enhancement) - отсроченное контрастирование гадолинием.

1. Fontana M et al. Heart Fail Rev. 2015;20(2):133–144.

Биомаркеры и клиническая лабораторная диагностика

Сердечные биомаркеры¹

Слабовыраженное повышение уровня сердечного тропонина (Т или I)

Значительное повышение уровня NT-proBNP

Лабораторные исследования^{1,2} (для исключения AL-амилоидоза)

Аномальное соотношение свободных легких цепей

Иммунофиксация сыворотки крови и мочи (не SPEP)

SPEP — электрофорез в плазме сыворотки крови

1. Donnelly JP, Hanna M. *Cleve Clin J Med.* 2017;84(12 suppl 3):12–26. 2. Nativi-Nicolau J, Maurer MS. *Curr Opin Cardiol.* 2018;33(5):571–579.

Дифференциальная диагностика амилоидоза. Подтверждение АТТР-КМП

Инвазивный метод

Биопсия (ЭМБ) +
типирование амилоида¹

Неинвазивный метод

Сцинтиграфия миокарда
с применением
остеотропных РФП¹

Генетическое
обследование¹

1. Gillmore JD, et al. *Circulation*. 2016; 133(24):2404–2412.

Выполнение биопсии ткани и амилоидного типирования

Цель биопсии

- 1) подтвердить амилоидную инфильтрацию
- 2) дать окончательную этиологическую классификацию амилоидогенного белка¹

Это критически важно для подтверждения AL-амилоидоза^{2,3}

С разрешения авторов Springer Nature Customer Service Centre GmbH: Springer Nature, Heart Fail Rev, Fontana M, Chung R, Hawkins PN, Moon JC. Cardiovascular magnetic resonance for amyloidosis. Heart Fail Rev. 2015 Mar; 20 (2): 133–44

1. Maurer MS, et al. *Circulation* 2017;135(14):1357–1377; 2. Siddiqui OK, Ruberg FL. *Trends Cardiovasc Med*. 2018;28(1):10–21; 3. Mohty D, et al. *Arch Cardiovasc Dis*. 2013;106(10):528–540; 4. Ruberg FL, Berk JL. *Circulation*. 2012;126(10):1286–1300.

Типирование амилоида обязательно для выбора патогенетической терапии

Иммуногистохимия

- Следует помнить, что даже у опытных специалистов могут наблюдаться противоречивые результаты. В случае несоответствия результатов клинической картине требуются дополнительные исследования

Иммуно-электронная микроскопия

- Специфичность 99,5%

Масс-спектрометрия («золотой стандарт»)

- Данная методика позволяет дифференцировать мельчайшие изменения в амилоидных депозитах, обладает крайне высокой чувствительностью и специфичностью. Позволяет исследовать образцы, даже залитые парафином. Основной недостаток — очень высокая стоимость

Типирование амилоида обязательно для выбора патогенетической терапии

Световая иммуногистохимия

- Коммерческие антитела основаны на AA-амилоидозе, корректно типировет около 90% случаев

Иммуно-электронная микроскопия

- Чувствительность 76%, специфичность 99,5%, при изучении подкожного жира позволяет корректно типировать практически 99% случаев с применением коммерчески доступных антител

Масс-спектрометрия («золотой стандарт»)

- антитело-независимая методика, способы: laser capture microdissection, MudPIT

Сцинтиграфия в сочетании с тестированием на наличие/отсутствие легких цепей* может помочь диагностировать АТТР-КМП

Три различные радиофармпрепарата (РФП) были тщательно изучены³

^{99m}Tc-PYP (меченый технецием пирофосфат) США †

^{99m}Tc-DPD (меченый технецием дикарбоксипропандифосфонат) Европа

^{99m}Tc-HMDP (меченый технецием гидроксиметилдифосфонат) Европа

Спектр накопления радиоактивной метки в сердце у пациентов и здоровых людей

Контроль

AL-амилоидоз

АТТР-КМП

Перепечатано из Journal of the American College of Cardiology, 46(6), Perugini E, Guidalotti PL, Salvi F, et al, Noninvasive etiologic diagnosis of cardiac amyloidosis using ^{99m}Tc-DPD scintigraphy, 1076–84, Copyright 2005, с разрешения Elsevier

* Исключить AL амилоидоз: исследование на наличие моноклонального белка с помощью иммунофиссации белков сыворотки и мочи с оценкой уровня свободных легких цепей иммуноглобулинов в сыворотке

† В Соединенных Штатах ^{99m}Tc-PYP (99m Пирофосфат технеция) не одобрен FDA для диагностики АТТР-КМП, но он все чаще используется медицинским сообществом.

1. Gillmore JD, et al. *Circulation*. 2016; 133(24):2404–2412; 2. Perugini E, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2005; 46(6):1076–1084; 3. Rapezzi C, et al. *J Nucl Cardiol* 2018; doi: 10.1007/s12350-018-1235-6.

Критерии использования сцинтиграфии для визуализации сердца

Два подхода к определению количественного накопления РФП в миокарде

Полуколичественный: визуальное сравнение с накоплением в костях (ребрах) через 3 часа^{1,2}

Степень 0

Нет накопления и нормальное накопление в ребрах

Степень 1

Накопление меньше накопления в ребрах

Степень 2

Накопление равно накоплению в ребрах

Степень 3

Накопление больше, чем накопление в ребрах с умеренным/отсутствующим накоплением в ребрах

Количественный: соотношение накопления в миокарде и в контралатеральном легком через 1 час³

Соотношение H/CL $\geq 1,5$ указывает на ATTR-КМП

Алгоритм диагностики

Повышенное клиническое подозрение на амилоидоз сердца

Пожилые люди с клиническими, биомаркерными данными, а также данными визуализации, свидетельствующими о возможном амилоидозе сердца

Диагностическое консультирование

Пациент-ориентированное консультирование по процессу диагностики

Обследование на предмет AL-амилоидоз сердца

Наличие моноклонального белка с помощью анализа свободной легкой цепи и иммунофиксации сыворотки крови/мочи?

ДА

НЕТ

Биопсия

Положительный результат
(Конго красный)

Отрицательный результат
(Конго красный)

Типирование тканей

Иммуногистохимия
и масс-спектрометрией
(AL по сравнению с
TTR по сравнению с
прочими)

Маловероятный AL-
амилоидоз сердца

Сцинтиграфия ^{99m}Tc-PYP *

Отрицательная

Положительная

Маловероятный
ATTR
Амилоидоз сердца*

ATTR-амилоидоз
сердца
Генотипирование
TTR

hATTR

ATTRwt

- Если сохраняется клиническое подозрение на амилоидоз сердца, несмотря на отрицательное сканирование ^{99m}Tc-PYP*, биопсия может рассматриваться для оценки других типов инфильтративной кардиомиопатии (например, АА)
- ^{99m}Tc-PYP * - наиболее широко применяемый РФП для диагностики ATTR кардиомиопатии с помощью сцинтиграфии

Клиническая характеристика больных с РКМП

Признак	Встречаемость в когорте (%)
Одышка	71
Отеки (в анамнезе)	46
Сердцебиение	33
Усталость	32
Ортопноэ	22
Боли за грудиной	22
ФК NYHA I	19
ФК NYHA II	53
ФК NYHA III-IV	28
Систолический шум	49
Третий тон	27
Хрипы в легких	18
Асцит	15
Отеки	15

Эхокардиография при РКМП

Инfiltrативная форма РКМП при амилоидозе

Эхокардиография при РКМП

Нерасширенные, негипертрофированные желудочки
и расширенные предсердия

Визуализация при РКМП

GLPS_LAX	-9.8 %
GLPS_A4C	-7.4 %
GLPS_A2C	-10.1 %
GLPS_avg	-8.7 %

Late Gadolinium enhancement
on CMR

Image courtesy Dr James Moon, UCLH

Лечение РКМП

- Терапия идиопатической РКМП сводится к симптоматической и зачастую не улучшает прогноз.
- Диуретики уменьшают застой в малом и большом круге кровообращения, однако их избыточное использование может привести к снижению давления наполнения ниже уровня, необходимого для поддержания сердечного выброса
- Дигоксин не показал благоприятного действия при нормальной систолической функции и должен применяться с осторожностью
- Показано применение антикоагулянтов, учитывая высокий риск тромбоэмболических осложнений
- Ранние исследования у детей выявили способность иАПФ остро снижать системное давление без увеличения сердечного выброса, поэтому требуется крайняя осторожность при их применении
- Хирургическое лечение сводится к трансплантации сердца

Первичная гипертрофическая КМП

- Впервые описана French и Germans в 1900 году
- Распространенность от 0.02 до 0.23%
- Заболеваемость — примерно от 0.3 до 0.5 на 100,000 населения (в диапазоне 0.005–0.07 %).
- Гипертрофия и отсутствие дилатации ЛЖ
- Встречаются семейные и спорадические формы ГКМП — генетически обусловленная «болезнь саркомера»
- Выраженность гипертрофии, обусловленной мутацией, зависит от генов-модификаторов и факторов среды

Мутации саркомерных протеинов при ГКМП

Profound genetic heterogeneity: ≥ 20 genes, >450 mutations*

*Includes mutations in non-sarcomeric proteins

Nabel: NEJM, 2003

Локализация гипертрофии миокарда при ГКМП

АСИММЕТРИЧНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МЖП

КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ ГИПЕРТРОФИЯ ЛЖ

АПИКАЛЬНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ

Разная морфология ГКМП в зависимости от возраста

Older patients

Younger patients

Выживаемость членов семей респондента с ГКМП в зависимости от мутации

Watkins: NEJM, 1992

Распределение причин смерти у пациентов с ГКМП

Общие вопросы лечения ГКМП

Медикаментозная терапия ГКМП

Миэктомия

Показания к миэктомии

- Обструкция ВТЛЖ
- Симптомы, значительно ухудшающие качество жизни
- Симптомы на фоне адекватной фармакотерапии

Morrow, 1959; Braunwald: Circ, 1963

Алкогольная септальная абляция

Показания к абляции

- Обструкция ВТЛЖ с подходящей анатомией
- Решение пациента или противопоказания к миэктомии
- Симптомы на фоне адекватной фармакотерапии

Частота осложнений (скорректировано по полу и возрасту)

Анатомические последствия вмешательств

Surgical septal myectomy —
34 patients

Resected tissue
 $2.7 \pm 1.4\%$ of LV mass
Range 0.8-5.9

Alcohol septal ablation —
45 patients

Infarcted tissue
 $8 \pm 3\%$ of LV mass
Range 3.6-13.6

Сердечная недостаточность при ГКМП

У большинства пациентов с ГКМП, процесс ремоделирования миокарда, характеризующийся миокардиальным фиброзом и истончением стенки, продолжается в течение всей жизни, и сопровождается снижением диастолической и систолической функции ЛЖ с дилатацией ЛЖ от незначительной до выраженной и снижением ФВ ЛЖ или тяжелой диастолической дисфункцией со значимым расширением предсердий с незначительной дилатацией ЛЖ или ее отсутствием.

Рекомендации по лечению обструкции выводящего тракта левого желудочка: общие подходы

	Класс ¹	Уровень ²
Пациенты с ОВТЛЖ (в покое или при нагрузке) по возможности следует избегать прием артериальных и венозных дилататоров, включая нитраты и ингибиторы фосфодиэстеразы.	IIa	C
Пациентам с впервые возникшей или плохо контролируемой фибрилляцией предсердий необходимо порекомендовать восстановление синусового ритма и адекватный контроль ритма до решения вопроса об инвазивной терапии.	IIa	C
Дигоксин не рекомендован пациентам с ОВТЛЖ (в покое или при нагрузке).	III	C

ОВТЛЖ = обструкция выносящего тракта левого желудочка

¹Класс рекомендации

²Уровень доказательности.

Рекомендации по медикаментозному лечению обструкции выводящего тракта левого желудочка

	Класс ¹	Уровень ²
В качестве первой линии терапии для уменьшения симптоматики у пациентов с ОВТЛЖ, возникающей в покое или при нагрузке ³ , рекомендуются β -блокаторы без вазодилатирующего действия с подбором максимально переносимой дозы.	I	B
Пациентам с ОВТЛЖ в покое или при нагрузке ³ , с непереносимостью или противопоказаниями к приему β -блокаторов рекомендован прием верапамила с подбором максимально переносимой дозы.	I	B
В качестве дополнительного препарата к лечению β -блокаторами (или, если невозможно, к верапамилу) для уменьшения симптоматики пациентам с ОВТЛЖ, возникающим в покое и при нагрузке ³ рекомендовано назначение дизопирамид с подбором максимально переносимой дозы	I	B
Дизопирамид с подбором максимальной переносимой дозы может рассматриваться в качестве монотерапии для уменьшения симптоматики у пациентов с ОВТЛЖ, возникающей в покое и при нагрузке ³ (при физической нагрузке или при пробе Вальсальвы) с осторожностью при наличии ФП (или с предрасположенностью к ФП), у которых препарат может повысить частоту желудочковых сокращений.	IIb	C
β -блокаторы или верапамил могут быть рекомендованы детям и взрослым без симптоматики с ОВТЛЖ, возникающей в покое или при нагрузке ³ , для снижения давления в левом желудочке.	IIb	C

Алгоритм лечения ХСН при ГКМП

Рекомендации пациентам с ХСН и сохранной фракцией выброса ЛЖ ($\geq 50\%$)

Для пациентов II–IV функционального класса по NYHA с ФВ ЛЖ $\geq 50\%$ и отсутствием данных за ОВТЛЖ (покоя или при нагрузке) для уменьшения симптомов сердечной недостаточности должно быть рассмотрено назначение β -блокаторов, верапамила или дилтиазема.	IIa	C
Для пациентов II–IV функционального класса по NYHA с ФВ ЛЖ $\geq 50\%$ и отсутствием данных за ОВТЛЖ (покоя или при нагрузке) для уменьшения симптомов сердечной недостаточности должно быть рассмотрено назначение малых доз петлевых и тиазидных диуретиков.	IIa	C

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ОВТЛЖ – обструкция выносящего тракта левого желудочка; NYHA – классификация по данным New York Heart Association.

¹Класс рекомендации, ²Уровень доказательности.

Рекомендации пациентам с ХСН и сниженной фракцией выброса ЛЖ (<50 %)

Ингибиторы АПФ должны быть рассмотрены в качестве дополнительной терапии к β -блокаторам, для пациентов без ОТВЛЖ с ФВЛЖ <50%, для уменьшения риска госпитализаций по поводу СН и риска внезапной смерти.³

IIa

C

Пациентам с ОТВЛЖ и ФВЛЖ <50% с целью уменьшения симптомов и снижения риска преждевременной смерти и госпитализации с СН необходимо рассмотреть возможность назначения бета-блокаторов в дополнение к ИАПФ (или АРА если иАПФ плохо переносятся)

IIa

C

Малые дозы петлевых и тиазидных диуретиков должны рассматриваться для назначения пациентам с симптоматикой с II–IV функциональным классом по NYHA и ФВЛЖ <50%, для уменьшения симптомов и снижения госпитализаций по поводу СН.³

IIa

C

Для всех пациентов с постоянной симптоматикой (II–IV функциональный класс по NYHA) и ФВЛЖ <50% — несмотря на лечение ингибиторами АПФ (или БРА, если больной не переносит ингибиторы АПФ) и β -блокаторами — должны рассматриваться антагонисты рецепторов к минералокортикоидам (АРМ), для уменьшения риска госпитализаций по поводу СН и преждевременной смерти.³

IIa

C

Низкие дозы дигоксина могут рассматриваться для пациентов без ОТВЛЖ, II–IV функциональный класс по NYHA и ФВ <50% и постоянной формой ФП, для контроля частоты сердечных сокращений.

IIb

C

Эндомиокардиальный фиброз

Первое описание — 1948 год (Девис)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Тропическая Африка — Уганда, Нигерия

Южная Индия, Шри-Ланка,
Бразилия, Колумбия

Европа —
спорадические
случаи

Эндомиокардиальный фиброз

- Соотношение мужчин и женщин в Африке 2:1, В Европе 1:2
- Средний возраст — от 10 до 30 лет
- Прогноз — 75% летальность в течение 2 лет
- 20% госпитализаций от СН в Африке приходится на эндомиокардиальной фиброз

Эндомиокардиальный фиброз

ЭТИОЛОГИЯ

Различные
инфекции,
паразиты,
простейшие

Дефицит
питательных
веществ и
элементов
(дефицит
белка и
магния)

Токсические
факторы
(серотонин,
витамин Д,
торий, цезий)

Генетическая
предрасположенность

Circulation. 2016;133:2503-2515.

Патогенез

Выделяют три стадии заболевания:

I — активная

II — прогрессирующая

III — хроническая

Описано три варианта поражения при эндомиокардиальном фиброзе

- Поражение ПЖ (10% случаев)
- ЛЖ (40%)
- Обоих желудочков (50% случаев)

Клиническая картина

Правожелудочковая сердечная недостаточность

Левожелудочковая сердечная недостаточность

Бивентрикулярная сердечная недостаточность

Диагностика

- Эхокардиография
- МРТ сердца с контрастированием
- «Золотым» стандартом диагностики является эндомиокардиальная биопсия

Клинический случай эндомиокардиального фиброза у пожилой женщины европеоидной расы

- Возраст — 73 года, европейка
- Клиника ХСН 3 ФК
- NT-pro-BNP 4597 пг/мл
- СРБ 0,8 мг/дл
- ЭКГ — синусовый ритм
- ЭХО-КГ — облитерация верхушек ЛЖ и ПЖ
- МРТ сердца — облитерация верхушек ЛЖ и ПЖ
- ЭМБ — активный миокардит
- Лечение — стандартная медикаментозная терапия СН+ГКС

Клинический случай эндомиокардиального фиброза у пожилой женщины европеоидной расы