

Дайте шанс на жизнь  
большему числу пациентов  
с ОПДИВО®

**ОПДИВО®**  
(ниволумаб)

<sup>1</sup> ОВ - общая выживаемость в исследовании CheckMate 141 по сравнению с химиотерапией (метотрексат, цетуксимаб, доцетаксел) по выбору врача [Ferris RL et al. Oral Oncology. 2018;81:45-5]

<sup>2</sup> Преимущество Опдиво в общей выживаемости перед химиотерапией отмечали как при экспрессии PDL1  $\geq 1\%$ , так и при PDL1  $< 1\%$  [Ferris RL et al. Oral Oncology. 2018;81:45-5]

<sup>3</sup> Под рутинной клинической практикой подразумеваются результаты

неинтервенционного исследования HANNA/NCT03114163

[Dietz A, et al. Poster presented at the American Society for Clinical Oncology Virtual Annual Meeting, May 29-31, 2020];

РКИ - рандомизированное клиническое исследование [Ferris RL et al. Oral Oncology. 2018;81:45-5]

ИНФОРМАЦИЮ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ В КОМПАНИЮ БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ по тел.: + 7 800 250 12 12 (Звонки по России бесплатно), адрес электронной почты: [medinfo.russia@bms.com](mailto:medinfo.russia@bms.com)

Инструкция по медицинскому применению препарата ОПДИВО® ЛП-№(000287)-(РГ-РУ)-220621.

 Bristol Myers Squibb™

ООО «Бристол-Майерс Сквибб»  
105064 Россия, Москва, ул. Земляной Вал, 9  
Тел. +7 495 755-92-67  
[www.bms.com/ru](http://www.bms.com/ru)



РАК  
ГОЛОВЫ И ШЕИ

\* При рефрактерности или прогрессировании  
ПРГШ после платиносодержащей терапии



**2-летняя общая выживаемость**  
16.9% vs 6.9%<sup>1</sup>

**Общая выживаемость**  
не зависела  
от PD-L1 статуса<sup>2</sup>

**Рутинная клиническая практика**  
подтверждает результаты РКИ<sup>3</sup>