



**ФУРАМАГ®**

ФУРАЗИДИН

**Побеждая резистентность,  
лечит цистит<sup>5</sup>**



#### СПОСОБ ПРИЕМА:<sup>5</sup>



**1–2 капсулы**



**3 раза в день**



**7–10 дней**



Всемирная  
Организация  
Здравоохранения



European  
Association  
of Urology

**Фурамаг®.** МНН: фуразидин. Регистрационный номер: П N014425/01. Лекарственная форма: капсулы. Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство – нитрофуран. Код АТХ: J01XE. Показания к применению. Инфекции, вызванные чувствительными к фуразидину микроорганизмами: урогенитальные инфекции (острые циститы, уретриты, пиелонефриты), инфекции кожи и мягких тканей, тяжелые инфицированные ожоги, гинекологические инфекции. Профилактически можно применять при урологических операциях, цистоскопии, катетеризации и др. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препаратам группы нитрофурана, беременность и период кормления грудью. Тяжелая хроническая почечная недостаточность. Детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы). С осторожностью – почечная недостаточность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Особые указания. Для уменьшения вероятности развития побочных действий Фурамаг® запивают большим количеством жидкости. При появлении побочных эффектов применение препарата прекращают (токсические явления чаще проявляются у больных со сниженной выделительной функцией почек). Способ применения и дозы. Препарат принимают после еды, запивая большим количеством жидкости. Взрослым назначают по 50–100 мг (1–2 капсулы) 3 раза в день. Курс лечения составляет 7–10 дней. При необходимости после 10–15-дневного перерыва курс повторяют. Для профилактики инфекции при урологических операциях, цистоскопии, катетеризации и др. препарат назначают по 50 мг однократно за 30 минут до процедуры. Если забыли принять очередную дозу, примите следующую дозу в обычное время. Нельзя принимать двойную дозу для замещения пропущенной дозы. Побочное действие. Фурамаг® мало токсичен. Редко наблюдались характерные для других нитрофуранов побочные действия: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, потеря аппетита, полиневрит, нарушения функции печени, аллергические реакции (кожная сыпь, папулезные высыпания). Если в период лечения Фурамагом обнаружилось побочное действие, не указанные в инструкции, то необходимо информировать лечащего врача. Передозировка. При передозировке наблюдают симптомы нейротоксического характера, атаксию и тремор. В случае отравления следует выпить большое количество жидкости. Для купирования острых симптомов применяют антигистаминные препараты. Для профилактики невритов возможно назначение витаминов (тиамина бромид). Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не следует применять Фурамаг® одновременно с ристомицином, хлорамфениколом, сульфаниламидами (повышается риск угнетения кроветворения). В период лечения желательно воздержаться от употребления алкогольных напитков, т.к. могут усилиться побочные действия. Не рекомендуется одновременно с нитрофуранами назначать препараты, способные «подкислять» мочу (в том числе аскорбиновую кислоту, кальция хлорид). Влияние на способность управлять транспортными средствами: не отмечено. Срок годности: 3 года. Условия отпуска из аптек: по рецепту врача. СИП от 27.04.2020 г. на основании ИМП от 29.09.2017 г.

\* С 3 лет. \*\* Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению.

1. По данным Proxima. Анализ назначений урологов, терапевтов, педиатров с 01.01.2019 г по 29.07.2021.  
2. Согласно Федеральным клиническим рекомендациям под ред. проф. Перепановой Т.С. «Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов», 2020 г., препараты выбора в лечении острого цистита: фуразидин, фосфомицин трометамол и нитрофурантоин.  
3. Перечень антибиотиков ВОЗ AWARE в числе первого класса экологичности содержит нитрофурантоин. Фуразидин представляет собой аналог нитрофурантоина, который имеет более сильный эффект, чем его исходное соединение. Источники: а) <https://apps.who.int/iris/handle/10665/327957>; б) Перепанова Т.С. Нитрофураны в урологической практике: все ли они одинаковы и почему мы возвращаемся к ним сегодня? // Экспериментальная и клиническая урология. – 2018. – № 3. – С. 91–100. 4. С.В. Яковлев, М.П. Суворова. Обоснование выбора антибиотика при инфекциях мочевыводящих путей с акцентом на экологическую безопасность антибактериальной терапии // Урология. – 2021. – № 4. Принята в печать. 5. ИМП Фурамаг® 50 мг от 29.09.2017 г. 6. Gilbert D.N. et al. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy/ App Version 4.3.2 Last Content update: 15.07.2021.

Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников.  
RUFUR0682 04.08.2021

СОЗДАНО OLAINFARM

ПРОИЗВЕДЕНО В ЛАТВИИ

125212, г. Москва,  
Головинское ш., д. 5, корп. 1, эт. 2, пом. 2137А  
Тел./факс +7 499 551 51 10  
[olainfarmrus@olainfarm.com](mailto:olainfarmrus@olainfarm.com), [ru.olainfarm.com](http://ru.olainfarm.com)



СОВЕТЫ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ ПО ЭМПИРИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЦИСТИТЕ

# СОВЕТЫ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ ПО ЭМПИРИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЦИСТИТЕ



## ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКАДЕМИИ ДОКТОРА!

На информационной платформе Вы найдете:

- Интерактивные курсы и клинические случаи из различных областей медицины
- Записи вебинаров и конференций
- Актуальные медицинские статьи



# ТЫСЯЧИ ВРАЧЕЙ ВЫБИРАЮТ АНТИБИОТИКИ 1-ГО УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ<sup>1</sup>



**ФУРАМАГ®** – последнее поколение нитрофуранов:  
включены в первую линию терапии цистита  
с 1-ым уровнем экологичности<sup>2,3</sup>



## ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТИТА УЧИТЫВАЙТЕ:<sup>4</sup>



Уровень экологической безопасности антибиотика



Уровень природной активности антибиотика и приобретенной резистентности возбудителя к нему



Фармакокинетику препарата – преимущественно почечное выведение с созданием высоких концентраций в моче<sup>4</sup>



## СПЕКТР АКТИВНОСТИ АНТИБИОТИКОВ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ МВП<sup>6</sup>



E. Coli



St. Saprophyticus



E. faecalis



E. faecium

НИТРОФУРАНТОИН

ФОСФОМИЦИН

ЦЕФИКСИМ



● высокая активность ● недостаточная активность ● резистентность



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К АНАЛИЗУ МОЧИ



Проведите тщательный туалет наружных половых органов водой без применения антисептиков (у женщин в период менструаций при сборе анализа мочи следует использовать тампон для предотвращения попадания крови в биообразец)



Откройте стерильный контейнер для анализа мочи и, не дотрагиваясь до его внутренних стенок, соберите среднюю порцию утренней мочи



Плотно закройте крышку контейнера со взятым биообразцом



Образец мочи необходимо доставить в лабораторию в течение 2 часов после сбора



При невозможности доставки проб мочи в лабораторию в указанный срок разрешается хранить их при +4 °C в течение 24 часов с момента сбора

Руководство по клинической лабораторной диагностике «Бактериологический анализ мочи». Р.С. Козлов., В.В. Меньшиков, В.С. Михайлова, Б.Ф. Шуляк, Т.И. Долгих, А.Н. Круглов, А.В. Алиева, В.Е. Маликова. RUFUR0683 04.08.2021

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

# Листовка



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К АНАЛИЗУ МОЧИ



Проведите тщательный туалет наружных половых органов водой без применения антисептиков (у женщин в период менструаций при сборе анализа мочи следует использовать тампон для предотвращения попадания крови в биообразец)



Откройте стерильный контейнер для анализа мочи и, не дотрагиваясь до его внутренних стенок, соберите среднюю порцию утренней мочи



Плотно закройте крышку контейнера со взятым биообразцом



Образец мочи необходимо доставить в лабораторию в течение 2 часов после сбора



При невозможности доставки проб мочи в лабораторию в указанный срок разрешается хранить их при +4 °С в течение 24 часов с момента сбора

Руководство по клинической лабораторной диагностике «Бактериологический анализ мочи». Р.С. Козлов., В.В. Меньшиков, В.С. Михайлова, Б.Ф. Шуляк, Т.И. Долгих, А.Н. Круглов, А.В. Алиева, В.Е. Маликова. RUFURO683 04.08.2021

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



Blank area for additional notes or instructions, marked by horizontal dotted lines.